herpy

GRENOUILLES

Blue-sided Treefrog

Agalychnis annae

Agalychnis annae est une rainette de 6-8 cm originaire des forêts de montagne du Costa Rica : verte sur le dos, avec les yeux orange et les flancs et les cuisses bleu ciel. Elle est nocturne, vit en hauteur dans la végétation et est vulnérable à l'état sauvage. L'espèce demande un terrarium frais et bien aéré : 20-24 °C et air relativement sec en journée, avec une forte brumisation uniquement en soirée.

Famille: Phyllomedusidae Ancien nom: *Phyllomedusa annae*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**6-8 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**La nuit**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Toxines cutanées	**Aucune connue**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 60 cm** L × l × H pour 4 adultes
Température, jour	**20-24 °C**
Température, nuit	**15-18 °C**
Hygrométrie	**50-75 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 2-3 cm
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards dans l'eau**
Lieu de ponte	**Sur des feuilles au-dessus de l'eau**
Œufs par ponte	**47-162**
Éclosion	**5-8 jours** à 22-24 °C
Durée du stade larvaire	**60-250 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances directes sur l'entretien d'*Agalychnis annae*, et les valeurs données ici sont donc en partie empruntées à *Agalychnis moreletii*, qui vit à la même altitude, dans le même type de forêt de montagne, et a les mêmes exigences.
TEMPÉRATURE	*Agalychnis annae* vient de forêts situées plus haut que celles des rainettes plus connues et ne supporte pas la chaleur durablement. En journée, la température doit être de 20-24 °C et ne doit pas dépasser 25 °C, même brièvement.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité est maintenue à 50-75 % en journée, pendant que les grenouilles dorment.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Un bac d'eau propre doit toujours se trouver dans le terrarium.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Les UVB sont recommandés, car la vitamine D est nécessaire au métabolisme du calcium et les insectes n'en contiennent presque pas.
ALIMENTATION	*Agalychnis annae* ne mange que des insectes. Les grillons domestiques bruns constituent la meilleure base d'alimentation, après quelques jours de nourrissage avec une alimentation riche avant d'être donnés aux grenouilles.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Agalychnis annae* dort le jour sur les feuilles et est active la nuit.
AIRE D'ORIGINE	Costa Rica.