herpy

GRENOUILLES

Large-webbed Bell Toad

Bombina maxima

Bombina maxima est la plus grande espèce du genre : une grenouille robuste, gris-brun et fortement verruqueuse, de 6 à 8 cm, au ventre orange marbré de noir qu'elle exhibe lorsqu'elle se sent menacée. Elle provient des montagnes du sud-ouest de la Chine et exige une eau propre et fraîche ainsi qu'un terrarium frais. Elle est facile à entretenir tant que la température reste basse, mais elle est plus exigeante que *Bombina orientalis* en ce qui concerne la qualité de l'eau.

Famille: Bombinatoridae Ancien nom: *Bombinator maximus* **Toxines cutanées faibles**

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**6-8 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**6-15 ans**
Activité	**Le jour et au crépuscule**
Mode de vie	**Semi-aquatique**
Habitat	**Zone humide et forêt et prairie tempérées**
Toxines cutanées	**Faibles** Lavez-vous les mains après le contact et gardez les doigts loin des yeux et de la bouche
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**80 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 4 adultes
Température, jour	**18-23 °C**
Température, nuit	**12-17 °C**
Hygrométrie	**60-85 %**
Eau	**Aquaterrarium** profondeur 5-10 cm
UVB	**Facultatifs**
Repos hivernal	**4-8 °C** 8-12 semaines
Alimentation	**Insectes et vers/escargots**
Détention	**En groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards dans l'eau**
Lieu de ponte	**Dans l'eau**
Maturité sexuelle	**24-36 mois**
Œufs par ponte	**20-150**
Éclosion	**3-10 jours** à 18-22 °C
Durée du stade larvaire	**30-90 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	L'espèce nécessite un aquaterrarium dont environ deux tiers de la surface au sol sont occupés par l'eau et un tiers par la terre. Quatre adultes ont besoin d'au moins 80 × 40 × 40 cm.
TEMPÉRATURE	L'espèce provient de hautes terres fraîches et doit être maintenue plus au frais que la plupart des grenouilles. En journée, 18 à 23 °C conviennent, et la température ne devrait jamais dépasser 25 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit se situer entre 60 et 85 %. La grande partie aquatique fait l'essentiel du travail, il suffit donc de vaporiser légèrement la partie terrestre une fois par jour.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	L'eau doit avoir 5 à 10 cm de profondeur et les animaux doivent toujours pouvoir en sortir facilement, par exemple par des racines inclinées, des pierres plates ou des plantes.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Donnez 12 heures de lumière par jour en été et des journées un peu plus courtes en hiver, commandées par une minuterie. Une rampe LED à spectre lumière du jour fournit assez de lumière pour les plantes.
ALIMENTATION	Les proies doivent bouger. Donnez des insectes d'élevage courants, de taille adaptée : grillons, mouches, cloportes, vers de terre et petits escargots. Les vers de farine sont gras et ne sont donnés qu'occasionnellement.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est active de jour et au crépuscule et se voit souvent à découvert, à terre ou flottant à la surface. Elle se garde de préférence en groupe.
AIRE D'ORIGINE	Chine.