herpy

GRENOUILLES

## Waxy Monkey Tree Frog

# *Phyllomedusa sauvagii*

*Phyllomedusa sauvagii* est une grande rainette calme du Gran Chaco et des forêts voisines d'Amérique du Sud. Elle étale elle-même sur sa peau une couche cireuse et imperméable, et exige donc un terrarium plus chaud et plus sec que la plupart des autres rainettes. La sécrétion cutanée est biologiquement active ; lavez-vous donc les mains après tout contact.

Famille: Phyllomedusidae **Toxines cutanées faibles**

### INFORMATIONS ESSENTIELLES

#### L'ANIMAL

| | |
|---|---|
| Taille adulte | **7-10 cm**<br>longueur museau-cloaque |
| Espérance de vie | **5-10 ans** |
| Activité | **Au crépuscule et la nuit** |
| Mode de vie | **Arboricole** |
| Habitat | **Savane et forêt sèche** |
| Toxines cutanées | **Faibles**<br>Lavez-vous les mains après le contact et gardez les doigts loin des yeux et de la bouche |
| Difficulté | **Intermédiaire** |

#### ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Terrarium min. | **45 × 45 × 60 cm**<br>L × l × H pour 2 adultes |
| Température, jour | **24-29 °C** |
| Zone de bain de soleil | **29-32 °C** |
| Température, nuit | **18-21 °C** |
| Hygrométrie | **50-75 %** |
| Eau | **Gamelle d'eau** |
| UVB | **Recommandés**<br>Zone de Ferguson 2 |
| Repos hivernal | **18 °C**<br>4-6 semaines |
| Alimentation | **Insectes** |
| Détention | **Seul, en couple ou en groupe** |

#### REPRODUCTION

| | |
|---|---|
| Reproduction | **Ovipare** |
| Développement | **Têtards dans l'eau** |
| Lieu de ponte | **Sur des feuilles au-dessus de l'eau** |
| Maturité sexuelle | **12-18 mois** |
| Œufs par ponte | **200-800** |
| Éclosion | **5-9 jours** |
| Durée du stade larvaire | **28-42 jours**<br>de l'éclosion à la métamorphose |
| Alimentation des larves | **Algues/plantes et aliment complet** |
| Soins parentaux | **Aucun** |

#### PROTECTION ET FORMALITÉS

| | |
|---|---|
| CITES | **Non inscrite** |
| UICN | **Préoccupation mineure (LC)** |

## L'entretien en bref

| | |
|---|---|
| **LE TERRARIUM** | *Phyllomedusa sauvagii* est arboricole et a besoin de hauteur et de nombreuses branches. Pour deux animaux, 45 × 45 × 60 cm suffisent. |
| **TEMPÉRATURE** | Maintenez 24-29 °C le jour avec un point chaud de 29-32 °C en haut et une baisse à 18-21 °C la nuit. |
| **HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION** | L'hygrométrie doit se situer à 50-60 % le jour et monter à 70-75 % le matin et le soir, quand le terrarium est brumisé. C'est sec pour une rainette et une différence importante avec, par exemple, *Agalychnis callidryas*. |
| **EAU ET QUALITÉ DE L'EAU** | Placez un bac d'eau stable avec des pierres lisses ou un bord incliné, afin que la grenouille puisse facilement en sortir, et changez l'eau chaque jour. La grenouille absorbe l'eau par la peau et s'assoit volontiers dans le bac. |
| **ÉCLAIRAGE ET UVB** | Donnez 12 heures de lumière par jour et l'obscurité la nuit, et utilisez un éclairage pour plantes si le terrarium est planté. |
| **ALIMENTATION** | *Phyllomedusa sauvagii* mange des insectes : grillons, blattes, papillons de nuit, mouches et vers de cire. La proie ne doit pas être plus large que la tête de la grenouille. Beaucoup de grenouilles refusent les proies vermiformes. |
| **COMPORTEMENT ET MANIPULATION** | *Phyllomedusa sauvagii* est calme et lente et marche au lieu de sauter. Elle est active au crépuscule et la nuit, mais s'habitue à devenir active quand des proies arrivent dans le terrarium. |
| **AIRE D'ORIGINE** | Argentine, Bolivie, Paraguay et Brésil. |