herpy

IGUANES

Anolis vert

Anolis carolinensis

Anolis carolinensis est un lézard mince et grimpeur du sud-est des États-Unis, qui passe du vert au brun selon la température, la lumière et l'humeur. Il mesure 12-20 cm queue comprise, est diurne et se nourrit de petits insectes. Il exige un terrarium haut, lumineux et humide, avec des UVB et une zone de chauffe, et le mâle est gardé seul ou avec quelques femelles.

Famille: Dactyloidae Nom anglais: Green Anole Ancien nom: *Ameiua bullaris; Anolis baccatus; Anolis podargicus; Anolius carolinensis; Norops baccatus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**12-20 cm** longueur totale queue comprise
Poids	**2-6 g**
Espérance de vie	**4-8 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Forêt et prairie tempérées**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 60 × 60 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**22-28 °C**
Zone de bain de soleil	**30-35 °C**
Température, nuit	**18-24 °C**
Hygrométrie	**60-70 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 2
Alimentation	**Insectes**
Détention	**Seul ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**4-12 mois**
Taille de la ponte	**1-2 œufs**
Pontes par an	**6-10**
Incubation	**35-49 jours** à 28-30 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un anolis seul a besoin d'un terrarium d'au moins 60 × 60 × 60 cm (longueur × largeur × hauteur). Plus grand vaut mieux, surtout en hauteur, car l'espèce grimpe et utilise tout l'espace.
TEMPÉRATURE	La zone de chauffe doit être à 30-35 °C mesurés sur la branche juste sous la lampe chauffante. Le reste du terrarium est maintenu à 22-28 °C le jour, et la nuit 18-24 °C conviennent.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit se situer en moyenne à 60-70 %, plus basse en milieu de journée et plus haute la nuit. Vaporisez les plantes matin et soir, pour que l'animal puisse boire les gouttes sur les feuilles.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et a besoin d'une lumière puissante et d'UVB chaque jour. Elle se chauffe à la mi-ombre, et la lampe UVB doit donner la zone 2 de Ferguson, c'est-à-dire un indice UV d'environ 3 au plus sur la zone de chauffe.
ALIMENTATION	*Anolis carolinensis* est insectivore et prend des proies vivantes qui bougent.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les mâles sont territoriaux et se montrent en hochant la tête, en déployant le fanon et en se gonflant. Deux mâles dans le même terrarium se battent, et le plus faible se blesse ou succombe au stress.
AIRE D'ORIGINE	États-Unis.