herpy

IGUANES

Crapaud cornu du Texas

Phrynosoma cornutum

Phrynosoma cornutum est un lézard large et aplati, à la tête cornue et aux flancs bordés de deux rangées d'écailles pointues. Il vit dans les prairies sèches et ouvertes et les broussailles du sud des États-Unis et du nord du Mexique. Il atteint 7-13 cm du museau au cloaque, est diurne et mange surtout des fourmis. C'est précisément l'alimentation qui fait obstacle : difficile à remplacer, elle fait de l'espèce l'un des lézards les plus difficiles à maintenir en terrarium.

Famille: Phrynosomatidae Nom anglais: Texas horned lizard Ancien nom: *Agama cornuta; Phrynosoma brevicornis; Phrynosoma bufonium; Phrynosoma harlanii; Phrynosoma planiceps*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**7-13 cm** longueur museau-cloaque
Poids	**25-90 g**
Espérance de vie	**7-9 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre et fouisseur**
Habitat	**Semi-désert et savane**
Difficulté	**Expert**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**100 × 50 × 40 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**27-29 °C**
Zone de bain de soleil	**38-42 °C**
Température, nuit	**18-22 °C**
Hygrométrie	**20-40 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**24 mois**
Taille de la ponte	**14-37 œufs**
Pontes par an	**1**
Incubation	**40-61 jours** à 27-30 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien de *Phrynosoma cornutum*. L'entretien repose donc sur le milieu de vie : terrain ouvert et sec, sol meuble, soleil intense et alimentation à base de fourmis.
TEMPÉRATURE	L'espèce aime le soleil et doit disposer d'un point d'insolation dont la surface atteint 38-42 °C, mesurés au thermomètre infrarouge.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit être faible, 20-40 %, et le terrarium doit sécher complètement au cours de la journée. Le substrat ne doit pas être détrempé.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et passe la journée en plein soleil ; elle a donc besoin d'un éclairage puissant et d'UVB toute l'année.
ALIMENTATION	L'alimentation est la contrainte décisive. Dans la nature, environ 70 % de la nourriture se compose de fourmis moissonneuses (*Pogonomyrmex*), et les jeunes ne mangent que de petites fourmis.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Phrynosoma cornutum* est calme et tranquille, et vit solitaire. Elle se fait peu remarquer et passe facilement inaperçue, car elle se fond dans le substrat.
AIRE D'ORIGINE	États-Unis et Mexique.