herpy

IGUANES

Western fence lizard

Sceloporus occidentalis

Sceloporus occidentalis est un petit lézard rapide, aux écailles rugueuses, originaire de l'ouest des États-Unis, que l'on voit posé sur les pierres, les troncs et les clôtures en plein soleil. Le mâle porte des taches bleues sur le ventre et la gorge, qu'il exhibe en faisant des pompes. L'espèce atteint environ 21 cm, est diurne et se nourrit d'insectes. Elle exige un point d'insolation puissant, des UVB, un terrarium spacieux et un couvercle bien fermé.

Famille: Phrynosomatidae Ancien nom: *Sceloporus longipes; Sceloporus smaragdinus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**14-23 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**4-5 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole, rupicole et terrestre**
Habitat	**Terrain rocheux et forêt et prairie tempérées**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**80 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**27-28 °C**
Zone de bain de soleil	**38-42 °C**
Température, nuit	**18-24 °C**
Hygrométrie	**30-50 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Repos hivernal	**8-12 °C** 8-12 semaines
Alimentation	**Insectes**
Détention	**Seul, en couple ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**12-24 mois**
Taille de la ponte	**3-17 œufs**
Pontes par an	**1-3**
Incubation	**55-65 jours** à 27-30 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu d'informations sur l'entretien de *Sceloporus occidentalis* en particulier ; il repose donc sur les besoins communs aux petites espèces héliophiles du genre.
TEMPÉRATURE	Le jour, la température doit être de 27-28 °C. Directement sous une lampe chauffante, il faut un point d'insolation de 38-42 °C, mesuré en surface avec un thermomètre infrarouge.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit être modérée, autour de 30-50 %. L'espèce vit dans des zones ouvertes et ensoleillées et ne supporte pas une humidité constante et saturée, mais le substrat ne doit pas non plus être complètement sec.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*Sceloporus occidentalis* est diurne et héliophile ; elle a besoin d'une lumière intense et d'UVB toute l'année.
ALIMENTATION	*Sceloporus occidentalis* est insectivore. Dans la nature, elle mange des grillons, des araignées, des tiques, des scorpions, des fourmis et des coléoptères, et prend de temps à autre un lézard plus petit.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Sceloporus occidentalis* est vigilante, rapide et territoriale. Les mâles se mettent en scène par des pompes, des hochements de tête et en gonflant le corps. L'espèce ne s'apprivoise pas et ne convient pas à la manipulation.
AIRE D'ORIGINE	États-Unis et Mexique.