herpy

LACERTIDÉS

Lézard de Gallot

Gallotia galloti

Gallotia galloti est un lézard robuste et diurne de Tenerife et de La Palma. Les mâles ont la tête et l'avant du corps noirs, avec des joues et des flancs bleus, et atteignent 44 cm. L'espèce mange à la fois des insectes et des fruits, est craintive et très agressive envers ses congénères ; elle se garde de préférence en couple, dans un grand terrarium ensoleillé ou dans un enclos extérieur.

Famille: Lacertidae Nom anglais: Gallot's Lizard

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**30-44 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**8-12 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Rupicole et terrestre**
Habitat	**Semi-désert et terrain rocheux**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**100 × 70 × 60 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**25-31 °C**
Zone de bain de soleil	**35-45 °C**
Température, nuit	**15-21 °C**
Hygrométrie	**40-60 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 3
Repos hivernal	**12-15 °C** 8-12 semaines
Alimentation	**Insectes, fruits et plantes**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**24-36 mois**
Taille de la ponte	**2-9 œufs**
Pontes par an	**1-2**
Incubation	**44-90 jours** à 28-31 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe III**
Annexe UE	**Annexe C**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

À propos de l'espèce

Gallotia galloti est le plus grand des lézards des Canaries à Tenerife et à La Palma. Le corps est robuste, la tête large et les yeux grands, avec un iris rouge orangé. Les mâles atteignent 44 cm au total et jusqu'à 14 cm du museau au cloaque, mais presque aucun adulte n'a une queue entière, si bien que la plupart sont plus petits. Les femelles sont nettement plus petites que les mâles. Chez les mâles, la tête et l'avant du corps sont noirs, le dos est vert jaunâtre avec des bandes transversales sombres, et les joues et les flancs portent des taches bleues éclatantes. Les femelles et les jeunes sont gris à bruns, avec des raies longitudinales claires ou de fines bandes transversales, et un dessin sombre en V ouvert vers l'arrière sur la gorge claire. De nombreux vieux mâles ressemblent tellement à des femelles qu'on ne les reconnaît que de près.

Le dessin varie selon les îles et selon les régions de Tenerife : les mâles du nord et du nord-est ont les joues bleues et des bandes transversales jaunes bien nettes, ceux du centre et du sud sont plus sombres, presque noirs, avec de grandes taches bleues sur les flancs, et ceux de La Palma ont les joues et la gorge bleues. Les animaux du commerce peuvent appartenir à différentes formes, et il est donc utile d'en connaître l'origine.

L'espèce est rapide, vigilante et très craintive, et les animaux en terrarium d'intérieur se montrent rarement quand des gens sont à proximité. Entre eux, ils sont extrêmement agressifs. Les mâles adultes sont territoriaux, et même un couple peut finir par voir le plus faible, en général la femelle, mordu à mort s'il n'y a pas assez de place et de cachettes. Les animaux émettent des sifflements quand ils creusent et se poursuivent. Un couple qui fonctionne peut être gardé ensemble pendant de nombreuses années. La longévité n'est pas documentée ; 8-12 ans est une estimation fondée sur des lézards de même taille.

Répartition et habitat

Gallotia galloti vit à Tenerife et à La Palma, aux îles Canaries, ainsi que sur l'îlot rocheux de Roque de Fuera, l'un des Roques de Anaga, au large de la côte nord-est de Tenerife. L'espèce n'existe pas à l'état naturel à El Hierro ni à La Gomera. Les observations à Madère ne sont pas prises en compte.

À Tenerife, il existe deux grandes formes : une du nord, qui vit dans le nord et le nord-est plus humides, et une du sud, au centre et au sud. La Palma a sa propre forme. L'espèce va de la côte jusqu'en haute montagne, et des animaux ont été observés jusqu'à 3 700 m.

> **Aire d'origine:** Espagne.

HABITAT

Gallotia galloti vit dans des endroits dégagés et ensoleillés, riches en cachettes : murets de pierre, tas de pierres, coulées volcaniques, fourrés, vignobles et plantations. L'espèce est abondante, s'installe vite dans les nouveaux milieux créés par l'homme et se voit même en pleine ville. Sur le versant nord de Tenerife, elle va de la côte jusqu'à environ 1 000 m, où commencent les nuages d'alizé ; la laurisylve et la forêt de pins très dense sont largement évitées.

Les animaux sont diurnes et cherchent leur nourriture au sol et dans les buissons. Chaque mâle tient un territoire et se tient volontiers sur une pierre élevée, où il est visible de loin. La période d'accouplement s'étend de mars à juillet, et les œufs sont pondus au printemps et en été. L'espèce est active toute l'année, mais chaque animal observe des périodes de repos quand il fait froid.

Le régime est mixte : arthropodes, escargots et charognes, mais aussi une grande part de fruits, de fleurs et de feuilles. Les fruits constituent une part importante de l'alimentation des adultes, et de nombreuses plantes des Canaries voient leurs graines dispersées par les lézards. Les jeunes prennent surtout des invertébrés.

Entretien

LE TERRARIUM

Gallotia galloti creuse et se déplace surtout au sol : la surface au sol compte donc plus que la hauteur. Un couple doit disposer d'un terrarium d'au moins 100 × 70 × 60 cm (longueur × largeur × hauteur), soit environ 0,7 m² de surface au sol. Plus grand vaut mieux, et un terrarium extérieur ou un enclos en plein soleil est la meilleure solution en été, car à l'extérieur les animaux sont souvent beaucoup moins craintifs. Pendant la saison froide, ils doivent rester à l'intérieur.

Le sol doit être assez profond pour qu'ils puissent y creuser : un mélange de terre, de sable et de feuilles décomposées sur 10-15 cm, maintenu légèrement humide, avec des feuilles en couche supérieure pour que l'humidité ne s'évapore pas. Gardez de préférence une partie du sol sèche. Proposez des morceaux d'écorce, des pierres plates, des tas de pierres et des morceaux de racines comme abris et emplacements de bain de soleil, ainsi qu'une végétation dense qui supporte quelques égratignures. Il doit y avoir de nombreuses cachettes aux deux extrémités, pour qu'une femelle dominée puisse se retirer.

Ne gardez qu'un couple par terrarium. Plusieurs mâles ne peuvent jamais cohabiter, et en groupe les animaux se mordent, les femelles pondent peu ou pas d'œufs et seulement 1-2 par couvée. Un mâle avec deux femelles est possible dans un grand terrarium très pourvu en cachettes, mais un couple est le plus sûr. Pour la ponte, placez une coupelle de mélange de tourbe et de sable légèrement humide, d'environ 14 cm de diamètre et 9 cm de hauteur, partiellement recouverte d'un tesson de pot. La femelle ne creuse alors pas n'importe où.

En savoir plus: Hygrométrie, brumisation et ventilation

TEMPÉRATURE

Gallotia galloti est un animal qui aime le soleil et doit pouvoir se réchauffer. La température diurne du terrarium se situe à 25-31 °C, et un spot au-dessus d'une pierre plate donne une température de surface de 35-45 °C. À l'état sauvage, les animaux actifs maintiennent une température corporelle de 32-34 °C. La nuit, la température descend à 15-21 °C, et la chaleur nocturne n'est pas nécessaire.

Une hibernation fraîche de 8-12 semaines à 12-15 °C, avec les lampes chauffantes éteintes et des jours plus courts, convient à l'espèce et favorise la reproduction, en général de la mi-décembre à la mi-février. L'appétit diminue de lui-même à l'automne, et l'on cesse de nourrir les animaux quelques semaines avant le repos, pour que l'intestin soit vide. Seuls des animaux sains et bien nourris peuvent hiberner, et ils doivent être exempts d'acariens et de parasites internes. Après le repos, la température et la durée du jour augmentent progressivement, et les animaux recommencent à manger en quelques jours.

HYGROMÉTRIE ET EAU

L'hygrométrie doit se situer à 40-60 %. Le terrarium doit être bien aéré, et une partie du sol doit rester sèche. Le sol est maintenu légèrement humide, pas détrempé, pour que la couche de feuilles continue de retenir l'humidité.

Les animaux boivent tous les jours. Donnez une coupelle peu profonde d'eau fraîche, renouvelée chaque jour. Après l'hibernation, les animaux boivent beaucoup avant de recommencer à manger.

ÉCLAIRAGE ET UVB

Gallotia galloti est diurne et se chauffe au soleil pendant plusieurs heures : le terrarium doit donc offrir un éclairage puissant et des UVB. À l'intérieur, on utilise un tube T5 pour la zone de Ferguson 3 au-dessus de l'emplacement de bain de soleil, de façon que l'animal reçoive un indice UV de 3-5 au niveau de la tête ; la distance se détermine avec un mesureur d'UV. Le verre bloque les UVB : le tube doit donc se trouver à l'intérieur du terrarium ou dans une partie ouverte du couvercle. À l'extérieur, les UVB viennent du soleil.

La durée du jour suit naturellement la saison : 12-14 heures en été et environ 8 heures pendant l'hibernation. Le spot est allumé 5 à 7 heures en milieu de journée. Remplacez le tube UVB selon les indications du fabricant.

En savoir plus: Lumière et UVB

ALIMENTATION

Gallotia galloti est omnivore, et une grande part du régime des adultes est végétale. Proposez des fruits comme la banane, le melon, les figues, la tomate et les baies, des fleurs et des feuilles, des graines ramollies et des légumes crus. Trop de fruits provoque un surpoids et des problèmes dentaires. Donnez les fruits comme une partie du repas, et non comme le repas entier.

En plus, les animaux reçoivent des insectes : grillons, criquets, blattes, vers de farine, larves de mouches et vers de terre. Les jeunes prennent surtout des insectes. Les animaux acceptent aussi de la pâtée pour chat ramollie en petites quantités, mais ce n'est pas nécessaire. Saupoudrez la nourriture de calcium et donnez régulièrement un complément vitaminé avec D3, sauf si l'animal reçoit des UVB. Les vitamines et le calcium peuvent aussi être donnés dans l'eau de boisson, selon le dosage du fabricant. Nourrissez un jour sur deux, avec ce que l'animal mange en quelques minutes. Les jeunes sont nourris tous les jours.

En savoir plus: Proies : élevage et reproduction En savoir plus: Calcium, vitamines et compléments

COMPORTEMENT ET MANIPULATION

Gallotia galloti est craintive et vigilante, et les animaux continuent de fuir éperdument quand quelqu'un entre dans la pièce. À l'extérieur, dans un enclos, ils deviennent plus confiants et peuvent parfois manger dans la main. Évitez d'attraper l'animal ; la queue se détache sous l'effet du stress et repousse sans nouvelles vertèbres.

Les mâles sont violemment territoriaux et menacent en montrant leurs flancs bleus. Un couple vit paisiblement tant qu'il y a de nombreuses cachettes, mais la femelle est attaquée par périodes. Vérifiez que la femelle n'a pas de plaies et séparez les animaux en cas d'attaques répétées. L'accouplement se fait par une morsure à la nuque, et non au flanc comme chez de nombreux autres lézards. L'espèce ne doit pas être partagée avec d'autres espèces.

Reproduction

MATURITÉ SEXUELLE ET SEXAGE

Les mâles sont plus grands que les femelles et ont une tête plus forte et des joues et des flancs bleus. Les femelles et les jeunes ont un dessin sombre en V sur la gorge claire. Chez les jeunes, le sexe ne peut être déterminé avec certitude qu'au bout d'un certain temps. Les animaux atteignent la maturité sexuelle après deux à trois ans.

ACCOUPLEMENT

La période d'accouplement s'étend de mars à juillet. Après l'hibernation, le mâle se réveille en premier. Le mâle mord la femelle à la nuque pendant l'accouplement, et le couple ne reste pas uni au-delà de l'accouplement. Surveillez les animaux les premiers jours et séparez-les si la femelle se blesse.

PONTE ET COUVÉES

La femelle pond entre avril et août, 1-2 couvées par an. La première couvée compte en moyenne 4-5 œufs (2-9), et la seconde environ 3 (2-6). Chez les groupes de femelles et dans les terrariums trop petits, les couvées sont plus petites. Les œufs mesurent environ 19 × 13 mm et grossissent pendant le développement. Placez une coupelle de tourbe et de sable légèrement humides comme lieu de ponte et contrôlez-la chaque jour pendant la période. La femelle peut manger les œufs si elle n'a pas d'endroit approprié.

INCUBATION

Retirez les œufs dès qu'ils sont pondus et placez-les dans une boîte d'incubation avec un mélange de tourbe et de sable légèrement humide, sans les retourner. La durée d'incubation dépend de la température et de sa stabilité, et se situe entre 44 et 90 jours. À 28-31 °C stables, les œufs éclosent après 63-68 jours, et avec 34 °C le jour et 18 °C la nuit après 62-89 jours. Les jeunes qui viennent d'éclore mesurent 12-15 cm au total, dont environ 4 cm de corps.

En savoir plus: Incubation des œufs

ÉLEVAGE DES JEUNES

Les jeunes sont agressifs entre eux et doivent être élevés séparément dès les premiers jours, sinon ils se mordent et peuvent mourir. Les adultes mangent aussi volontiers les jeunes. Nourrissez chaque jour avec de petits insectes saupoudrés de calcium, et donnez de la lumière et des UVB comme aux adultes. Les animaux les plus craintifs se portent le mieux dans un terrarium offrant de nombreuses cachettes, où ils peuvent rester tranquilles.

Santé et erreurs courantes

La plupart des problèmes viennent d'un manque de chaleur, d'un manque d'UVB, d'une alimentation unilatérale et d'un manque de place. Les plus typiques sont :

- Fragilité osseuse en cas d'UVB et de calcium insuffisants. Donnez des UVB ou du soleil, et saupoudrez la nourriture.
- Surpoids et problèmes dentaires en cas d'excès de fruits. Gardez les fruits à une part plus réduite du régime.
- Acariens et parasites internes chez les nouveaux animaux. Mettez-les en quarantaine et faites-les examiner, et faites un examen de selles avant l'hibernation.
- Plaies après des combats et des morsures. Séparez les animaux s'il y a des plaies.
- Perte de la queue. Elle repousse, mais sans nouvelles vertèbres.
- Problèmes pendant l'hibernation chez les animaux maigres ou malades. Si l'animal est malade ou en sous-poids, il ne doit pas hiberner.
- Difficultés de ponte en l'absence de lieu approprié. La femelle est agitée et creuse ; consultez un vétérinaire en cas de faiblesse.

Un animal en bonne santé a les yeux clairs, une queue bien remplie, la peau lisse et un bon appétit. Consultez un vétérinaire expérimenté en reptiles si l'animal ne mange pas, maigrit ou respire la bouche ouverte.

En savoir plus: Quarantaine et hygiène

Demandez toujours conseil à quelqu’un qui s’y connaît

Ce guide est un bon point de départ, mais il ne remplace pas l’expérience. Les animaux diffèrent, et une grande partie de l’essentiel s’apprend auprès de personnes qui élèvent l’espèce depuis des années. Parlez à un éleveur, à un terrariophile expérimenté ou à un vétérinaire qui connaît les reptiles et les amphibiens avant d’acquérir l’animal - et de nouveau si quelque chose vous semble anormal.