herpy

LACERTIDÉS

Lézard des souches

Lacerta agilis

Lacerta agilis est un lézard robuste, aux pattes courtes et diurne, qui vit dans les landes sablonneuses, les dunes et les talus bien exposés. L'espèce est présente du sud de l'Angleterre jusqu'au lac Baïkal, et le mâle arbore des flancs d'un vert éclatant en période de reproduction. Elle atteint environ 20 cm, se nourrit d'insectes et a besoin de soleil, d'une hibernation au froid et, de préférence, d'un enclos extérieur.

Famille: Lacertidae Nom anglais: Sand Lizard

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**15-25 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**6-12 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre et fouisseur**
Habitat	**Forêt et prairie tempérées**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**120 × 60 × 60 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**22-30 °C**
Zone de bain de soleil	**38-45 °C**
Température, nuit	**12-17 °C**
Hygrométrie	**40-60 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 2
Repos hivernal	**4-6 °C** 4-16 semaines
Alimentation	**Insectes**
Détention	**En couple ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**24-36 mois**
Taille de la ponte	**4-15 œufs**
Pontes par an	**1-2**
Incubation	**40-45 jours** à 24-25 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM

Lacerta agilis se porte mieux dans un terrarium extérieur ou un enclos en plein soleil, où l'animal bénéficie de la lumière naturelle du soleil, du rythme naturel des jours et des saisons et de proies vivantes.

TEMPÉRATURE

Lacerta agilis est une espèce héliophile. La température diurne dans le terrarium se situe entre 22 et 30 °C, et le poste d'exposition doit avoir une température de surface de 38-45 °C, mesurée avec un thermomètre infrarouge.

HYGROMÉTRIE ET EAU

Lacerta agilis provient de milieux secs et ouverts, et l'humidité de l'air dans le terrarium se situe entre 40 et 60 %. Une bonne ventilation importe plus que l'humidité, et le substrat ne doit pas être constamment mouillé.

ÉCLAIRAGE ET UVB

Lacerta agilis se chauffe la plus grande partie de la journée et a besoin d'une lumière intense et d'UVB. En extérieur, les UVB proviennent du soleil.

ALIMENTATION

Lacerta agilis est insectivore. Dans la nature, le régime se compose de coléoptères et de leurs larves, de sauterelles, de grillons, d'araignées, de chenilles, de cloportes et de mouches. Les fourmis sont évitées.

COMPORTEMENT ET MANIPULATION

Lacerta agilis est une espèce solitaire, qui ne rencontre ses congénères que pour s'accoupler. Les mâles sont territoriaux et chassent leurs rivaux des meilleurs postes d'exposition.

AIRE D'ORIGINE

Royaume-Uni, France, Andorre, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Liechtenstein, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Pologne, Italie, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Macédoine du Nord, Albanie, Bulgarie, Grèce, Roumanie, Moldavie, Ukraine, Biélorussie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Turquie, Kazakhstan, Kirghizstan, Mongolie et Chine.