herpy

LACERTIDÉS

Tégu rouge

Salvator rufescens

Salvator rufescens est le tégu à la constitution la plus robuste : un lézard diurne et fouisseur du Chaco sec et de l'ouest de l'Argentine, du Paraguay et de la Bolivie, qui devient plus rouge avec l'âge. Les mâles atteignent jusqu'à 140 cm. L'espèce exige un terrarium construit sur mesure d'au moins 300 × 150 × 150 cm, un substrat profond pour creuser, une forte chaleur et des UVB, et elle vit 15-20 ans.

Famille: Teiidae Nom anglais: Red Tegu Ancien nom: *Tupinambis rufescens*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**80-140 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**15-20 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre et fouisseur**
Habitat	**Semi-désert et forêt sèche**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**300 × 150 × 150 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**24-35 °C**
Zone de bain de soleil	**52-57 °C**
Température, nuit	**20-23 °C**
Hygrométrie	**70-80 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Repos hivernal	**15-20 °C** 17-22 semaines
Alimentation	**Insectes, fruits, plantes, vertébrés et vers/escargots**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**24-36 mois**
Taille de la ponte	**15-35 œufs**
Pontes par an	**1**
Incubation	**40-75 jours** à 29-30 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

À propos de l'espèce

Salvator rufescens est un tégu robuste, à la tête large, au corps lourd et à la longue queue ronde. C'est le plus massif des tégus. Le nom *rufescens* vient du latin rufescere, devenir rougeâtre, et fait allusion à la couleur. Les jeunes tout juste éclos sont brunâtres à verdâtres, avec des bandes transversales noires et plusieurs rayures blanches interrompues le long du corps, et n'ont presque pas de rouge. La couleur rouge vient avec l'âge et est en général la plus intense chez les mâles.

Les femelles atteignent environ 90 cm queue comprise. Les mâles deviennent nettement plus grands, jusqu'à 140 cm et environ 60 cm du museau au cloaque, et développent de grosses joues, parce que les muscles des mâchoires grossissent. L'espèce grandit vite et atteint la maturité sexuelle après 2-3 ans.

S. rufescens est étroitement apparenté à *Salvator merianae*, et les deux espèces s'hybrident naturellement dans une zone d'hybridation stable du centre de l'Argentine, là où leurs aires se rencontrent. Il ressemble aussi à *Salvator duseni*. L'espèce était autrefois classée sous le nom de *Tupinambis rufescens*.

C'est un lézard intelligent, qui peut être dressé et apprend à reconnaître son éleveur, mais cela reste un animal sauvage et non un animal de compagnie : il mord, griffe et frappe de la queue quand il a peur. Un adulte exige un terrarium de la taille d'une petite pièce, une alimentation qui coûte cher et 15-20 ans de soins.

Répartition et habitat

Salvator rufescens vit dans l'ouest et le nord de l'Argentine (notamment Chaco, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis et La Pampa), au Paraguay et en Bolivie (Beni, Santa Cruz et Tarija). La localité type est Mendoza. L'espèce n'existe pas au Brésil ; l'ancienne mention du Paraná a été rejetée. La zone d'hybridation avec *Salvator merianae* se situe dans la transition entre le Chaco sec et l'Espinal, dans le centre de l'Argentine.

> **Aire d'origine:** Argentine, Paraguay et Bolivie.

HABITAT

Salvator rufescens vit dans le Chaco sec, avec sa forêt sèche épineuse et sa broussaille, et dans des régions sèches couvertes de broussailles plus au sud-ouest, où le climat est tempéré, avec des étés chauds et des hivers froids. L'espèce est diurne et vit dans des terriers qu'elle creuse elle-même, et elle creuse aussi en dehors de la dormance.

En hiver, l'animal s'enfouit et est pratiquement inactif pendant les périodes les plus froides ; dans certaines régions, la dormance dure jusqu'à sept mois. La température dans le terrier n'est pas documentée pour l'espèce. La reproduction a lieu au printemps et au début de l'été sud-américains, d'octobre à décembre, et les femelles font une ponte par an.

L'espèce est opportuniste et mange à la fois des animaux et des végétaux : des insectes et d'autres arthropodes, des rongeurs, des oiseaux et des œufs d'oiseaux, des lézards, des poissons, des charognes, des fruits et des graines.

Entretien

LE TERRARIUM

On dispose de peu de connaissances spécifiques sur l'entretien de *Salvator rufescens*. L'espèce a à peu près la même taille et le même mode de vie que *Salvator merianae*, et l'entretien est le même ; les chiffres pour le terrarium, la température, l'humidité et la lumière sont communs aux tégus argentins et n'ont pas été mesurés spécifiquement pour l'espèce.

Un mâle adulte a besoin d'un terrarium d'au moins 300 × 150 × 150 cm (longueur × largeur × hauteur) et une femelle adulte d'au moins 240 × 120 × 120 cm. De si grands terrariums doivent être construits ou commandés sur mesure. Plus grand, c'est encore mieux.

L'animal creuse aussi en dehors de la dormance, si bien que le sol est l'élément le plus important de l'aménagement. Prévoyez une couche profonde, de préférence 30-60 cm, au moins à l'une des extrémités. Un mélange d'environ 40 % de terreau de jardin sans engrais, 40 % de fibres de coco et 20 % de sable pour bac à sable avec une couche de feuilles mortes par-dessus retient l'humidité et se creuse bien. Évitez le sable sec, le terreau avec additifs et les copeaux de pin et d'épicéa. Remplacez tout le substrat au moins chaque trimestre.

Le terrarium doit avoir une ouverture frontale et du grillage au plafond, et toutes les lampes doivent être bien fixées et protégées, car les tégus les renversent. La porte doit pouvoir être verrouillée. Placez un grand bac d'eau bas et changez l'eau tous les jours, parce que l'animal y entraîne du substrat et y laisse ses excréments. Prévoyez aussi une boîte-cachette avec de la sphaigne humide et plusieurs cachettes sèches.

L'animal est gardé seul. Deux animaux peuvent être gardés ensemble dans un terrarium deux fois plus grand, mais il n'est pas certain que cela fonctionne. Un mâle et une femelle ne sont pas gardés ensemble en dehors de la période de reproduction, et les petits animaux ne sont pas gardés avec les grands.

En savoir plus: Hygrométrie, brumisation et ventilation

TEMPÉRATURE

La zone d'insolation doit avoir une température de surface de 52-57 °C, mesurée avec un thermomètre infrarouge. Le côté chaud est à 32-35 °C et le côté frais à 24-29 °C, et la nuit l'éclairage et le chauffage sont éteints, si bien que la température descend à 20-23 °C. Utilisez des spots halogènes ou des ampoules à incandescence, plusieurs rapprochées, de sorte qu'un adulte soit chauffé uniformément sur tout le corps. Les émetteurs de chaleur en céramique et les tapis chauffants sont trop faibles pour la zone d'insolation.

Salvator rufescens vient d'une région aux hivers froids et est adapté à une longue dormance. Le repos hivernal reste pourtant facultatif en captivité. Un animal en bonne santé peut être maintenu actif et nourri toute l'année, et c'est la bonne option pour les jeunes de la première année, les animaux nouvellement acquis, les animaux en sous-poids et tous les animaux dont la santé est incertaine.

Si l'on veut offrir un repos hivernal, les règles du thème sur le repos hivernal s'appliquent : seulement des animaux sains et en bon état corporel, une réduction progressive sur plusieurs semaines et un intestin vide avant d'abaisser la température. Les durées de jeûne du thème couvrent les animaux jusqu'à 3 kg ; pour les tégus de plusieurs kilos, il n'existe pas de règle établie, le jeûne devrait donc durer au moins un mois, et la température est maintenue au-dessus de 13 °C pendant que l'intestin se vide. Maintenez ensuite 15-20 °C avec une couche profonde et humide pour creuser et un accès à de l'eau potable. Le repos dure 4-5 mois. La température et la durée sont empruntées à *Salvator merianae* ; à l'état sauvage, la dormance de *S. rufescens* dure jusqu'à sept mois. Pesez l'animal avant et pendant le repos, et interrompez-le en cas de perte de poids nette ou de signes de maladie. Au réveil, la température et la lumière sont relevées progressivement sur quelques jours, l'eau est donnée en premier, et la nourriture est proposée quand l'animal est actif et chaud.

En savoir plus: Repos hivernal et saisons

HYGROMÉTRIE ET EAU

L'humidité de l'air doit être de 70-80 %, comme pour les autres tégus argentins. Gardez le substrat humide, mais pas boueux, en l'arrosant chaque semaine, et brumisez tous les jours. L'espèce vient d'une région plus sèche que *Salvator merianae* ; l'extrémité chaude doit donc être sèche et aérée, tandis que la boîte-cachette avec de la sphaigne humide (90-100 %) et le substrat profond et humide offrent les endroits humides. Mesurez avec deux hygromètres, un à chaque extrémité. L'animal doit toujours avoir de l'eau potable fraîche.

ÉCLAIRAGE ET UVB

Salvator rufescens est diurne et a besoin d'une lumière forte et d'UVB 12-14 heures par jour. En plus des ampoules chauffantes, le terrarium doit avoir un éclairage puissant de type lumière du jour, et le soleil direct dans une volière extérieure sécurisée est un bon complément quand le temps le permet.

Les tégus relèvent de la zone 3 de Ferguson. Utilisez un tube T5 HO de 10-14 % dans un luminaire avec réflecteur au-dessus de la zone d'insolation, de sorte que le tube couvre environ la moitié de la longueur du terrarium. L'objectif est un indice UV de 3-4 sur la zone d'insolation et plus bas ailleurs. Sans grillage, la distance entre le tube et le dos est généralement de 43-55 cm selon le tube ; le grillage absorbe une partie du rayonnement UVB, et la distance doit alors être plus courte. Les tubes perdent en puissance et sont remplacés selon les instructions du fabricant.

En savoir plus: Lumière et UVB

ALIMENTATION

Salvator rufescens est omnivore, avec une dominante de nourriture animale. Les jeunes et les animaux élevés en captivité peuvent être difficiles et préfèrent souvent la viande. L'alimentation suit les mêmes règles que pour *Salvator merianae* : environ 60 % de nourriture animale, 30 % de légumes et 10 % de fruits pour les adultes, et environ 90 % de nourriture animale, surtout des insectes, et 10 % de légumes verts pour les jeunes. Les fruits sont donnés avec parcimonie, car l'animal devient facilement gras.

Les jeunes jusqu'à 6 mois sont nourris 5 fois par semaine, de 7 à 12 mois 4 fois, de 1 à 2 ans 3 fois et les adultes 2 fois par semaine. La portion est à peu près de la taille du crâne de l'animal, et les proies entières doivent être un peu plus petites que le crâne.

Donnez des blattes, des grillons, des sauterelles, des vers de farine, des vers de terre et des escargots, des poussins, des cailles, des souris, des rats, de la viande hachée avec du calcium, des poissons entiers et des crevettes. Les proies entières valent mieux que la viande, parce qu'elles contiennent du calcium. La viande hachée et les insectes sont saupoudrés de calcium et de multivitamines. Les œufs et le poisson sont donnés cuits : le blanc d'œuf cru contient de l'avidine, qui empêche l'absorption de

la biotine, et certains poissons contiennent de la thiaminase, qui détruit la vitamine B1. Les légumes verts sont le pissenlit, le chou frisé et d'autres types de choux, la carotte, la courgette et la citrouille. Ne donnez jamais d'avocat, d'oignon, d'épinards, de laitue, de brocoli ni d'aubergine.

En savoir plus: Proies : élevage et reproduction En savoir plus: Calcium, vitamines et compléments

COMPORTEMENT ET MANIPULATION

Salvator rufescens a la réputation d'être calme et relativement familier et peut être dressé. La familiarité ne vient pas d'elle-même : l'animal doit être manipulé calmement et régulièrement dès son jeune âge, et les jeunes sont timides. Laissez-les s'habituer à votre main, approchez-vous par le côté et non brusquement par le dessus, et touchez-les pendant qu'ils mangent, pour qu'ils apprennent à distinguer la main de la nourriture.

Comme les autres tégus, les jeunes de 45-75 cm traversent une période de quelques mois pendant laquelle ils sont sur la défensive et irritables. Laissez-leur du calme et de l'espace, et utilisez de gros gants si l'animal doit être manipulé. Un adulte a une morsure puissante, des griffes acérées et une queue qui frappe comme un fouet. L'animal creuse et explore et a besoin de variété dans le terrarium. Lavez-vous les mains après avoir touché l'animal et le terrarium, car *Salmonella* est courante chez les reptiles.

Reproduction

MATURITÉ SEXUELLE ET SEXAGE

Les mâles sont nettement plus grands que les femelles et développent de grosses joues ; les muscles des mâchoires grossissent encore en période de reproduction. L'espèce atteint la maturité sexuelle après 2-3 ans. Les femelles doivent être entièrement adultes et en bon état corporel avant d'être mises à la reproduction.

ACCOUPLEMENT

À l'état sauvage, les animaux s'accouplent au printemps, après la dormance ; en Argentine, la période de reproduction va d'octobre à décembre. La femelle fait une ponte par an. En captivité, le mâle et la femelle sont gardés séparément en dehors de la période de reproduction et réunis sous surveillance une fois qu'ils se sont réveillés et ont de nouveau mangé. Les détails de l'accouplement en captivité ne sont pas documentés.

PONTE ET COUVÉES

La femelle fait une ponte par an, de 15-35 œufs, environ 21 en moyenne. La manière dont le nid est construit n'est pas documentée pour l'espèce ; chez *Salvator merianae*, les œufs sont pondus dans un nid d'herbe sèche, de brindilles et de feuilles dans le sol. Offrez à la femelle une couche profonde et humide pour creuser, du matériau de nid sec et du calme.

INCUBATION

La durée et la température d'incubation ne sont pas documentées pour l'espèce, les chiffres sont donc empruntés à *Salvator merianae*. Les œufs éclosent après 40-75 jours, et une température stable autour de 29 °C donne le plus d'œufs éclos et les plus grands jeunes.

En savoir plus: Incubation des œufs

ÉLEVAGE DES JEUNES

Les jeunes mesurent environ 8 cm du museau au cloaque à l'éclosion. Ils grandissent très vite et ont besoin d'insectes et de petites proies, de calcium, d'UVB et de beaucoup de chaleur. Gardez-les séparés selon la taille, parce que les grands animaux peuvent manger les petits. Les jeunes sont maintenus actifs et nourris pendant leur premier hiver.

Santé et erreurs courantes

Les problèmes de santé sont les mêmes que chez les autres tégus, et la plupart tiennent à des erreurs d'entretien :

- Maladie métabolique des os en cas de manque de calcium, de vitamine D ou d'UVB.
- Surpoids en cas d'excès de viande grasse et de fruits et de manque d'exercice. Pesez régulièrement l'animal.
- Infections respiratoires en cas de température trop basse ou de substrat constamment mouillé.
- Brûlures si l'animal peut atteindre les ampoules chauffantes. Protégez-les.
- Vers intestinaux et autres parasites, surtout chez les animaux importés. Les nouveaux animaux doivent être mis en

quarantaine et leurs selles analysées.

- Problèmes de mue en cas d'air trop sec.
- Difficultés de ponte chez les femelles sans endroit adapté pour creuser.
- Perte de poids ou maladie pendant ou après un repos hivernal chez des animaux qui n'étaient pas en bonne forme.

L'animal doit être conduit chez un vétérinaire expérimenté en reptiles s'il maigrit, cesse de manger en dehors d'un repos hivernal, respire la bouche ouverte ou paraît apathique.

En savoir plus: Quarantaine et hygiène En savoir plus: Maladies courantes et signes de maladie

Demandez toujours conseil à quelqu’un qui s’y connaît

Ce guide est un bon point de départ, mais il ne remplace pas l’expérience. Les animaux diffèrent, et une grande partie de l’essentiel s’apprend auprès de personnes qui élèvent l’espèce depuis des années. Parlez à un éleveur, à un terrariophile expérimenté ou à un vétérinaire qui connaît les reptiles et les amphibiens avant d’acquérir l’animal - et de nouveau si quelque chose vous semble anormal.