herpy

SALAMANDRES ET TRITONS

Western Tiger Salamander

Ambystoma mavortium

Ambystoma mavortium est une salamandre massive pouvant atteindre 30-35 cm, originaire des prairies, forêts et semi-déserts d'Amérique du Nord, aux bandes transversales et taches jaunes sur fond sombre. Les larves vivent dans l'eau, tandis que les adultes passent la majeure partie de leur vie dans des galeries qu'ils creusent eux-mêmes et sortent la nuit. Certains animaux ne se métamorphosent jamais et deviennent matures en gardant leurs branchies.

Famille: Ambystomatidae

Toxines cutanées faibles

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**15-30 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**10-20 ans**
Activité	**La nuit**
Mode de vie	**Terrestre et fouisseur**
Habitat	**Semi-désert et forêt et prairie tempérées**
Toxines cutanées	**Faibles** Lavez-vous les mains après le contact et gardez les doigts loin des yeux et de la bouche
Difficulté	**Débutant**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**50 × 25 × 30 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**18-22 °C**
Température, nuit	**16-20 °C**
Hygrométrie	**80-95 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Non nécessaires**
Alimentation	**Insectes, vertébrés et vers/escargots**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Larves dans l'eau**
Lieu de ponte	**Dans l'eau**
Maturité sexuelle	**5-36 mois**
Œufs par saison	**100-1 000**
Éclosion	**19-50 jours**
Durée du stade larvaire	**75-150 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Autres larves et petits invertébrés aquatiques (daphnies, larves de moustiques)**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Les adultes peuvent être gardés dans de nombreux types de contenants.
TEMPÉRATURE	La température doit se situer à 18-22 °C le jour et, si possible, un peu plus bas la nuit, tant pour les larves que pour les adultes. L'espèce supporte mieux le froid que la chaleur.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	Le substrat doit être humide, mais jamais détrempé ni boueux, car l'animal absorbe l'eau par la peau et ne boit pas par la bouche. L'humidité de l'air n'a pas été mesurée pour l'espèce ; un substrat humide donne environ 80-95 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Un récipient d'eau bas et lourd n'est pas indispensable, mais c'est une bonne sécurité : si le substrat devient trop sec, l'animal cherche le récipient, qui prévient ainsi les décès par dessiccation.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est nocturne et n'a pas besoin d'éclairage particulier. Rien n'indique qu'elle ait besoin d'UVB, et une forte lumière UV peut abîmer les yeux et la peau des amphibiens.
ALIMENTATION	Les larves et les animaux néoténiques mangent des vers de terre, des vers de compost, des grillons de taille adaptée, des larves de fausse teigne et de petits poissons.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les adultes creusent et restent cachés la majeure partie de la journée. Ce sont des chasseurs nocturnes actifs, qui guettent leurs proies à l'affût.
AIRE D'ORIGINE	Canada, États-Unis et Mexique.