herpy

SALAMANDRES ET TRITONS

Eastern Tiger Salamander

Ambystoma tigrinum

Ambystoma tigrinum est une salamandre robuste de la moitié orientale des États-Unis, mesurant généralement 15-20 cm, avec des taches jaunes à vert olive sur un fond brun à noir. Les larves vivent dans l'eau, tandis que les adultes passent la majeure partie de leur vie dans des galeries qu'ils creusent eux-mêmes et ne sortent que la nuit. Certains individus ne se métamorphosent jamais et deviennent matures avec leurs branchies.

Famille: Ambystomatidae

Toxines cutanées faibles

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**15-33 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**12-20 ans**
Activité	**La nuit**
Mode de vie	**Terrestre et fouisseur**
Habitat	**Forêt et prairie tempérées**
Toxines cutanées	**Faibles** Lavez-vous les mains après le contact et gardez les doigts loin des yeux et de la bouche
Difficulté	**Débutant**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**50 × 25 × 30 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**18-22 °C**
Température, nuit	**16-22 °C**
Hygrométrie	**80-95 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Non nécessaires**
Alimentation	**Insectes, vertébrés et vers/escargots**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Larves dans l'eau**
Lieu de ponte	**Dans l'eau**
Maturité sexuelle	**5-48 mois**
Œufs par saison	**100-1 000**
Éclosion	**12-50 jours**
Durée du stade larvaire	**75-150 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Autres larves et petits invertébrés aquatiques (daphnies, larves de moustiques)**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Les adultes peuvent être gardés dans de nombreux types de contenants.
TEMPÉRATURE	*Ambystoma tigrinum* a besoin de 18-22 °C le jour, aussi bien à l'état de larve que d'adulte, et la température peut descendre à 16 °C la nuit. L'espèce supporte mieux le froid que la chaleur.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	Le substrat doit être humide, mais jamais détrempé ni boueux, car l'animal absorbe l'eau par la peau. L'humidité de l'air n'est pas documentée pour l'espèce ; 80-95 % est une valeur empruntée à *Ambystoma mavortium*.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Les adultes n'ont pas besoin de partie aquatique : ce sont de mauvais nageurs et ils peuvent se noyer.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*Ambystoma tigrinum* est nocturne et n'a pas besoin d'un éclairage particulier. Rien n'indique que l'espèce ait besoin d'UVB, et un fort rayonnement UV peut abîmer les yeux et la peau des amphibiens.
ALIMENTATION	Les larves et les individus néoténiques mangent des vers de terre, des vers de compost, des grillons de taille adaptée, des larves de fausse teigne et de petits poissons (pas de poissons rouges).
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les adultes creusent et restent cachés la majeure partie de la journée. Ils sont nocturnes et chassent à l'affût. Beaucoup apprennent à reconnaître leur soigneur et quémandent de la nourriture.
AIRE D'ORIGINE	États-Unis.