herpy

SALAMANDRES ET TRITONS

Triton à peau rugueuse

Taricha granulosa

Taricha granulosa est un triton de 13 à 22 cm de long, originaire de la côte pacifique de l'Amérique du Nord, au dos sombre et granuleux et au ventre orange vif. Sa peau contient de la tétrodotoxine, l'un des poisons les plus puissants parmi les amphibiens, et l'animal est mortel s'il est avalé. L'espèce alterne entre l'eau et la terre, peut être maintenue en milieu aquatique toute l'année et doit être gardée au frais.

Famille: Salamandridae Nom anglais: Rough-skinned Newt Ancien nom: *Salamandra granulosa; Triturus granulosus; Triturus similans*

Fortes toxines cutanées

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**13-22 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**12-18 ans**
Activité	**Le jour et la nuit**
Mode de vie	**Semi-aquatique**
Habitat	**Zone humide et forêt et prairie tempérées**
Toxines cutanées	**Fortes** Évitez le contact avec la peau et lavez-vous soigneusement les mains après avoir travaillé dans le terrarium
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 30 × 40 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**18-21 °C**
Température, nuit	**14-18 °C**
Hygrométrie	**80-95 %**
Eau	**Aquaterrarium** profondeur 20-30 cm
UVB	**Non nécessaires**
Alimentation	**Insectes, aliment complet et vers/escargots**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Larves dans l'eau**
Lieu de ponte	**Dans l'eau**
Maturité sexuelle	**48-60 mois**
Œufs par saison	**7-30**
Éclosion	**21-42 jours**
Durée du stade larvaire	**60-150 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Petits invertébrés aquatiques (daphnies, larves de moustiques)**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	*Taricha granulosa* est l'espèce la plus aquatique du genre.
TEMPÉRATURE	*Taricha granulosa* aime la fraîcheur. En été, l'eau et l'air sont maintenus à 18-21 °C. S'il fait plus chaud, jusqu'à 24 °C, les animaux gagnent la terre ; il faut éviter les périodes prolongées au-dessus de 21 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	La partie terrestre et les cachettes au-dessus de l'eau doivent être humides, mais pas détrempées. L'humidité de l'air n'a pas été mesurée pour l'espèce ; un aquaterrarium avec couvercle et cachettes humides donne environ 80-95 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	L'eau doit avoir 20 à 30 cm de profondeur, et une eau plus profonde n'est pas nuisible : il est presque impossible de donner à l'espèce trop d'eau dans un aquarium ordinaire.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce n'a pas besoin d'UVB. La lumière naturelle ordinaire de la pièce ou un tube fluorescent faible le jour et l'obscurité la nuit suffisent.
ALIMENTATION	*Taricha granulosa* est un prédateur opportuniste. Dans la nature, elle mange des gammares, des insectes, des escargots, des sangsues, des têtards et des œufs d'amphibiens et de poissons.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'activité varie : certains animaux sont visibles le jour, d'autres se cachent sous les racines et les pierres et chassent la nuit.
AIRE D'ORIGINE	États-Unis et Canada.