herpy

SALAMANDRES ET TRITONS

Guizhou Crocodile Newt

Tylototriton kweichowensis

Tylototriton kweichowensis est un triton crocodile robuste, brun-noir, de 15-21 cm, orné de trois larges bandes orange à rougeâtres le long du corps. Il vit à terre dans les montagnes du Guizhou et du Yunnan et ne se rend guère dans l'eau que pour se reproduire. Il se maintient au mieux dans un grand terrarium comportant une partie terrestre et une partie aquatique.

Famille: Salamandridae Ancien nom: *Pleurodeles kweichowensis* **Toxines cutanées faibles**

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**15-21 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**10-20 ans**
Activité	**Au crépuscule et la nuit**
Mode de vie	**Terrestre et semi-aquatique**
Habitat	**Forêt de montagne et zone humide**
Toxines cutanées	**Faibles** Lavez-vous les mains après le contact et gardez les doigts loin des yeux et de la bouche
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**90 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**18-25 °C**
Température, nuit	**15-20 °C**
Hygrométrie	**70-90 %**
Eau	**Aquaterrarium** profondeur 10-15 cm
UVB	**Non nécessaires**
Alimentation	**Insectes et vers/escargots**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Larves dans l'eau**
Lieu de ponte	**Sur des feuilles au-dessus de l'eau**
Œufs par saison	**50-150**
Pontes par an	**1**
Éclosion	**10-12 jours** à 25 °C
Durée du stade larvaire	**80-100 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Petits invertébrés aquatiques (daphnies, larves de moustiques)**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	*Tylototriton kweichowensis* demande un grand terrarium, car les animaux sont grands et lourds, ont besoin d'une solide partie terrestre avec un abri par individu, et d'assez d'eau pour la reproduction et pour un filtre.
TEMPÉRATURE	L'espèce se plaît à température ambiante normale : 18-25 °C le jour et 15-20 °C la nuit. En été, la température diurne peut se situer dans la partie haute de la fourchette, et en hiver on maintient 15-20 °C jour et nuit.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être élevée, mais le sol ne doit pas être détrempé ; 70-90 % est une estimation. La partie terrestre est maintenue humide sans devenir boueuse, et une partie du sol peut être plus sèche.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	La partie aquatique occupe environ la moitié du terrarium. La profondeur n'est pas documentée pour l'espèce ; 10-15 cm est une valeur empruntée à *Tylototriton verrucosus*.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Les UVB ne sont pas nécessaires, et l'espèce est surtout active au crépuscule et la nuit.
ALIMENTATION	Les adultes reçoivent des vers de terre hachés, des grillons et d'autres proies de taille adaptée. Les larves de fausse teigne et d'autres larves grasses sont appréciées, mais ne doivent pas constituer l'alimentation de base.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est lente et maladroite. On peut garder ensemble 2-3 animaux, à condition d'avoir assez d'abris pour chacun.
AIRE D'ORIGINE	Chine.