herpy

SALAMANDRES ET TRITONS

Himalayan Crocodile Newt

Tylototriton verrucosus

Tylototriton verrucosus est un grand triton crocodile brun foncé originaire des montagnes de l'ouest du Yunnan, du nord du Myanmar et des régions voisines. Il atteint 13-24 cm et c'est le plus aquatique des tritons crocodiles élevés en terrarium : pendant la saison chaude, il reste souvent entièrement dans l'eau, où il se montre actif et curieux.

Famille: Salamandridae Ancien nom: *Pleurodeles verrucosus; Triturus verrucosus* **Toxines cutanées faibles**

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**13-24 cm** longueur totale queue comprise
Poids	**12-18 g**
Espérance de vie	**10-20 ans**
Activité	**Au crépuscule et la nuit**
Mode de vie	**Semi-aquatique**
Habitat	**Forêt de montagne et zone humide**
Toxines cutanées	**Faibles** Lavez-vous les mains après le contact et gardez les doigts loin des yeux et de la bouche
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 30 × 35 cm** L × l × H pour 4 adultes
Température, jour	**18-25 °C**
Température, nuit	**15-20 °C**
Hygrométrie	**70-90 %**
Eau	**Aquaterrarium** profondeur 12-15 cm
UVB	**Non nécessaires**
Alimentation	**Insectes, vertébrés et vers/escargots**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Larves dans l'eau**
Lieu de ponte	**Dans l'eau**
Maturité sexuelle	**12-36 mois**
Œufs par saison	**30-200**
Éclosion	**10-12 jours** à 25 °C
Durée du stade larvaire	**90-150 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Autres larves et petits invertébrés aquatiques (daphnies, larves de moustiques)**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Quasi menacée (NT)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	*Tylototriton verrucosus* se maintient de préférence en aquaterrarium. Au-dessus d'environ 18 °C, la forme sombre peut être gardée entièrement dans l'eau.
TEMPÉRATURE	Le jour, la température doit être de 18-25 °C, avec environ 25 °C en été, et la nuit de 15-20 °C. En hiver, les animaux sont maintenus à 15-18 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air n'est pas déterminante dans une installation très aquatique ; 70-90 % est une estimation. Là où il y a de la terre, la partie terrestre est maintenue humide, mais pas boueuse.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	La profondeur d'eau est de 12-15 cm. Remplacer 20-30 % de l'eau toutes les deux semaines, et plus souvent s'il y a beaucoup de restes de nourriture.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est crépusculaire et nocturne, et les UVB ne sont pas nécessaires.
ALIMENTATION	L'espèce n'est pas difficile, et les grandes femelles peuvent manger une quantité étonnante en peu de temps.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Dans l'eau, l'animal est actif et curieux et peut devenir assez familier : il nage jusqu'à la vitre pour réclamer à manger et prend la nourriture à la pince et aux doigts.
AIRE D'ORIGINE	Chine, Myanmar (Birmanie), Inde et Thaïlande.