herpy

SCINQUES

Gold Skink

Eumeces schneiderii

Un scinque robuste, lisse et rapide, originaire des régions arides comprises entre l'Afrique du Nord et l'Asie centrale. *Eumeces schneiderii* présente une livrée allant du beige sable au brun olive, ornée de taches orange ; il s'enfouit volontiers dans le sable meuble et se révèle une espèce de terrarium robuste et longévive, pour peu qu'on lui offre du soleil, des UVB et un substrat profond.

Famille: Scincidae Ancien nom: *Eumeces schneideri; Novoeumeces schneideri*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**30-45 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**15-20 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre et fouisseur**
Habitat	**Désert et semi-désert**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**120 × 60 × 45 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**25-30 °C**
Zone de bain de soleil	**40-45 °C**
Température, nuit	**20-25 °C**
Hygrométrie	**20-40 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes, fruits et vertébrés**
Détention	**Seul ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**5-15 œufs**
Incubation	**40-60 jours** à 28-30 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM

Eumeces schneiderii vit au sol et fouit, de sorte que la surface au sol et le substrat sont l'essentiel. Un couple, ou un mâle avec deux femelles, a besoin d'au moins 120 × 60 × 45 cm (longueur × largeur × hauteur).

TEMPÉRATURE

Le terrarium doit présenter un gradient net. De jour, la température doit être de 25-30 °C, plus chaude près de l'emplacement de bain de soleil et plus fraîche à l'extrémité opposée.

HYGROMÉTRIE ET EAU

L'espèce provient de régions sèches et doit être maintenue au sec, avec une humidité de l'air de 20-40 %, en tout cas inférieure à 50 %. Il suffit de vaporiser légèrement une fois par semaine.

ÉCLAIRAGE ET UVB

L'espèce est diurne et doit disposer d'UVB pendant toute la durée d'éclairage. Elle appartient à la zone 3 de Ferguson et nécessite un indice UV d'environ 3 sur l'emplacement de bain de soleil.

ALIMENTATION

Eumeces schneiderii est omnivore, mais mange surtout des insectes vivants et d'autres petits animaux : grillons, blattes, vers de farine, ténébrions géants, vers à soie, escargots et vers de terre.

COMPORTEMENT ET MANIPULATION

L'espèce est curieuse et explore volontiers son environnement. Les nouveaux animaux sont souvent prudents, mais avec de la patience et un nourrissage à la pince, ils se calment.

AIRE D'ORIGINE

Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Israël, Territoires palestiniens, Chypre, Turquie, Syrie, Liban, Jordanie, Iran, Irak, Arabie saoudite, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Russie, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Afghanistan et Pakistan.