herpy

SCINQUES

Spiny Skink

Tribolonotus novaeguineae

Tribolonotus novaeguineae est un petit scinque timide des forêts pluviales de basse altitude de Nouvelle-Guinée, dont le dos porte des rangées d'écailles pointues recourbées vers l'arrière. Il vit caché dans la litière humide, est surtout actif au crépuscule et ne pond qu'un seul œuf à la fois. On sait peu de choses sur l'entretien de cette espèce précise, qui convient surtout comme animal d'exposition.

Famille: Scincidae Ancien nom: *Zonurus novaeguineae*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**16-20 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**10 ans**
Activité	**Au crépuscule et la nuit**
Mode de vie	**Terrestre et fouisseur**
Habitat	**Forêt tropicale humide et zone humide**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**24-27 °C**
Zone de bain de soleil	**27-28 °C**
Température, nuit	**22-24 °C**
Hygrométrie	**70-90 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et vers/escargots**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**36-48 mois**
Taille de la ponte	**1 œufs**
Pontes par an	**1-6**
Incubation	**65-85 jours** à 23-27 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Annexe D**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu d'informations sur l'entretien de *Tribolonotus novaeguineae*.
TEMPÉRATURE	La température diurne doit être de 24-27 °C, et une cachette chaude à 27-28 °C maintient l'animal actif, même s'il ne se prélasse pas au soleil. La nuit, 22-24 °C conviennent.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit être de 70-90 %, au plus haut la nuit, et le substrat doit toujours rester humide.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est active au crépuscule et n'a pas besoin d'un point d'exposition solaire intense, mais 12 heures de lumière par jour maintiennent le rythme circadien.
ALIMENTATION	*Tribolonotus novaeguineae* est insectivore.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Tribolonotus novaeguineae* est un animal à observer, non à manipuler. Lorsqu'il est saisi, il peut émettre des sons, faire le mort, tenter de fuir ou perdre sa queue, ce qui le stresse.
AIRE D'ORIGINE	Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée.