herpy

SERPENTS

Black Kingsnake

Lampropeltis nigra

Lampropeltis nigra est un serpent roi de taille moyenne à grande, originaire de l'est des États-Unis. Il est noir et, dans la partie sud de son aire de répartition, chaque écaille porte une petite tache jaune ou blanche. Il atteint 90-120 cm, se nourrit de rongeurs, de lézards, de grenouilles et d'autres serpents, et il est robuste et facile à entretenir. Il se garde seul dans un terrarium au sol, avec un point chaud et une hygrométrie modérée, et peut vivre plus de 20 ans.

Famille: Colubridae Ancien nom: *Lampropeltis getula nigra; Ophibolus getulus niger*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**90-120 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**15-25 ans**
Activité	**Le jour et au crépuscule**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Zone humide et forêt et prairie tempérées**
Difficulté	**Débutant**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**120 × 60 × 60 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**21-28 °C**
Zone de bain de soleil	**29-32 °C**
Température, nuit	**18-22 °C**
Hygrométrie	**40-60 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 2
Alimentation	**Vertébrés**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**5-15 œufs**
Incubation	**60-70 jours** à 26-29 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances propres à l'espèce sur l'entretien de *Lampropeltis nigra*.
TEMPÉRATURE	L'animal régule sa température en se déplaçant entre les endroits chauds et froids ; le terrarium doit donc présenter un gradient net.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'hygrométrie doit se situer à 40-60 %, mesurée avec un hygromètre numérique au milieu du terrarium. Elle est plus élevée du côté froid et la nuit, et plus basse du côté chaud, ce qui est normal. Il faut éviter un air moite.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est surtout active de jour et se chauffe au soleil dans la nature. Elle peut se passer d'UVB, mais les UVB sont recommandés pour un meilleur bien-être. Cela correspond à la zone 2 de Ferguson.
ALIMENTATION	*L. nigra* est carnivore et doit recevoir des proies entières. Les souris constituent l'alimentation de base, et lorsque l'animal grandit, on utilise de jeunes rats.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*L. nigra* est robuste et tolérant. Laissez un nouvel animal tranquille pendant environ 2 semaines et ne commencez la manipulation que lorsqu'il mange régulièrement.
AIRE D'ORIGINE	États-Unis.