herpy

TORTUES TERRESTRES ET AQUATIQUES

Tortue charbonnière

Chelonoidis carbonarius

Chelonoidis carbonarius est une tortue terrestre de taille moyenne, sombre, des savanes et lisières de forêt d'Amérique du Sud, avec des écailles rouges à orange sur la tête et les pattes. La carapace mesure généralement 30-35 cm, l'animal vit au moins 50 ans et c'est l'une des tortues terrestres tropicales les plus couramment maintenues en captivité. Elle a besoin d'une forte humidité et de chaleur toute l'année, et mange des végétaux, des fruits et un peu de nourriture animale.

Famille: Testudinidae Nom anglais: Red-Footed Tortoise Ancien nom: *Chelonoidis carbonaria; Geochelone carbonaria; Testudo carbonaria*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**30-45 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**50-70 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Savane, forêt sèche et forêt tropicale humide**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**280 × 140 × 60 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**24-29 °C**
Zone de bain de soleil	**32-35 °C**
Température, nuit	**20-23 °C**
Hygrométrie	**70-90 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 2
Alimentation	**Insectes, fruits, plantes et vers/escargots**
Détention	**Seul ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**2-7 œufs**
Incubation	**105-200 jours** à 28-31 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Non évaluée (NE)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM

Chelonoidis carbonarius est une tortue active, qui utilise toute la place qu'on lui donne. Elle vit au sol : la surface au sol compte donc plus que la hauteur.

TEMPÉRATURE

À l'intérieur, il doit y avoir un gradient. La température de l'air est de 24-29 °C le jour, et le point chaud sous la lampe est de 32-35 °C, mesuré sur le substrat même.

HYGROMÉTRIE ET EAU

L'espèce vient d'un climat chaud et humide et doit avoir une forte humidité : 70-90 %, avec de brefs pics proches de 100 %.

ÉCLAIRAGE ET UVB

C. carbonarius est diurne et doit disposer d'UVB lorsqu'elle n'est pas en plein soleil. Mesurez un indice UV de 2,0-3,0 au point chaud (zone 2 de Ferguson).

ALIMENTATION

C. carbonarius est omnivore et mange dans la nature des végétaux, des fleurs, des fruits, des champignons et un peu de nourriture animale.

COMPORTEMENT ET MANIPULATION

L'espèce est curieuse, active et relativement calme. Elle apprend à connaître son propriétaire, s'approche volontiers quand il y a de la nourriture et prend la nourriture dans la main ou avec une pince.

AIRE D'ORIGINE

Panama, Colombie, Venezuela, Guyana, Suriname, Guyane française, Brésil, Pérou, Bolivie, Paraguay, Argentine et Trinité-et-Tobago.