herpy

TORTUES TERRESTRES ET AQUATIQUES

Bell's Hinge-back Tortoise

Kinixys belliana

Kinixys belliana est une tortue terrestre africaine de taille moyenne, à la carapace allongée, dotée d'une charnière mobile à l'arrière qui permet de refermer la carapace sur les pattes postérieures et la queue. La carapace mesure 15-22 cm de long. L'espèce vit dans la savane, avec une saison des pluies et une saison sèche bien marquées, exige une chaleur stable ainsi qu'une certaine humidité, et se stresse facilement. Les animaux fraîchement importés portent souvent de nombreux parasites.

Famille: Testudinidae Ancien nom: *Cinixys belliana; Kinixys schoensis*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**15-22 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**30-50 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Savane**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**160 × 80 × 40 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**28-32 °C**
Zone de bain de soleil	**32-35 °C**
Température, nuit	**22-24 °C**
Hygrométrie	**60-80 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 2
Alimentation	**Insectes, fruits, plantes et vers/escargots**
Détention	**Seul ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**1-6 œufs**
Pontes par an	**1-2**
Incubation	**105-200 jours** à 28-31 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Non évaluée (NE)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de données fiables sur l'entretien de *Kinixys belliana*, car une grande partie des anciennes connaissances date de l'époque où plusieurs espèces étaient regroupées en une seule.
TEMPÉRATURE	L'animal doit être maintenu au chaud. En journée, la température doit être de 28-32 °C, et la zone d'insolation de 32-35 °C, mesurée sur le substrat.
HYGROMÉTRIE ET EAU	Espèce de savane, *K. belliana* a des besoins en humidité plus faibles que les espèces forestières *Kinixys homeana* et *Kinixys erosa*, mais elle apprécie l'humidité et doit être pulvérisée régulièrement.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*K. belliana* est diurne, mais surtout active tôt et tard dans la journée, lorsque la lumière est faible.
ALIMENTATION	*K. belliana* est omnivore, et les jeunes sont presque exclusivement carnivores.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est craintive et se rétracte dans sa carapace ou s'enfouit lorsqu'elle est dérangée. Elle est surtout active tôt le matin et tard dans la journée.
AIRE D'ORIGINE	Angola, Burundi, République centrafricaine, Congo-Kinshasa, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Rwanda, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Ouganda, Tanzanie et Malawi.