herpy

TORTUES TERRESTRES ET AQUATIQUES

## Eastern Mud Turtle

# *Kinosternon subrubrum*

*Kinosternon subrubrum* est une petite tortue des marais de couleur sombre, originaire du sud-est des États-Unis. Sa carapace mesure 8-12 cm, et l'espèce se déplace surtout le long du fond, dans des eaux peu profondes et riches en végétation. Son plastron possède deux charnières mobiles qui lui permettent de se refermer presque complètement, et elle peut vivre 20-50 ans. Timide et surtout active au crépuscule, elle demande un bac filtré à faible niveau d'eau, une lampe chauffante et des UVB.

Famille: Kinosternidae  Ancien nom: *Kinosternon pensylvanicum*

### INFORMATIONS ESSENTIELLES

#### L'ANIMAL

| | |
|---|---|
| Taille adulte | **8-12 cm**<br>longueur totale queue comprise |
| Poids | **90-260 g** |
| Espérance de vie | **20-50 ans** |
| Activité | **Au crépuscule** |
| Mode de vie | **Fouisseur et semi-aquatique** |
| Habitat | **Zone humide et forêt et prairie tempérées** |
| Difficulté | **Intermédiaire** |

#### ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Terrarium min. | **80 × 40 × 40 cm**<br>L × l × H pour 1 adulte |
| Température, jour | **24-29 °C** |
| Zone de bain de soleil | **30-33 °C** |
| Température, nuit | **20-24 °C** |
| Hygrométrie | **40-60 %** |
| Eau | **Aquaterrarium**<br>profondeur 15-20 cm |
| Température de l'eau | **21-24 °C** |
| UVB | **Recommandés**<br>Zone de Ferguson 2 |
| Alimentation | **Insectes, aliment complet, plantes, vertébrés et vers/escargots** |
| Détention | **Seul ou en couple** |

#### REPRODUCTION

| | |
|---|---|
| Reproduction | **Ovipare** |
| Maturité sexuelle | **36-96 mois** |
| Taille de la ponte | **2-5 œufs** |
| Pontes par an | **1-3** |
| Incubation | **75-125 jours**<br>à 26-29 °C |

#### PROTECTION ET FORMALITÉS

| | |
|---|---|
| CITES | **Annexe II** |
| Annexe UE | **Annexe B** |
| UICN | **Préoccupation mineure (LC)** |

## L'entretien en bref

| | |
|---|---|
| LE TERRARIUM | *Kinosternon subrubrum* se maintient dans un aquarium ou un bac bas avec une partie émergée, non dans un terrarium ordinaire. |
| TEMPÉRATURE | L'eau doit être à 21-24 °C, et un chauffe-eau avec protection est normalement nécessaire. La zone de bain de soleil doit atteindre 30-33 °C mesurés en surface, et l'air du bac 24-29 °C le jour. |
| HYGROMÉTRIE ET EAU | L'humidité de l'air a peu d'importance pour une tortue aquatique ; 40-60 % dans la pièce conviennent. |
| EAU ET QUALITÉ DE L'EAU | L'eau est profonde de 15-20 cm pour les adultes, avec des zones plates et moins profondes où l'animal peut se reposer et tendre le cou jusqu'à la surface. L'espèce nage mal, et une eau trop profonde la stresse. |
| ÉCLAIRAGE ET UVB | Les UVB sont recommandés afin que l'animal puisse synthétiser la vitamine D3 et assimiler le calcium, et la zone de bain de soleil doit disposer à la fois d'une lampe chauffante et d'un tube UVB, même si l'espèce se prélasse rarement. |
| ALIMENTATION | *Kinosternon subrubrum* est omnivore, mais surtout carnivore. |
| COMPORTEMENT ET MANIPULATION | *Kinosternon subrubrum* est timide et active, surtout au crépuscule, et on la voit le plus souvent lorsqu'elle explore le fond. |
| AIRE D'ORIGINE | États-Unis. |