herpy

TORTUES TERRESTRES ET AQUATIQUES

West African Mud Turtle

Pelusios castaneus

Pelusios castaneus est une tortue de taille moyenne originaire d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. La carapace atteint 18-28 cm et l'espèce peut vivre 30-50 ans. Rustique, active et gloutonne, elle exige un grand bac filtré avec de l'eau chaude, une zone d'insolation chaude et des UVB. Les animaux rentrent la tête sur le côté, sous le bord de la carapace, et les mâles poursuivent violemment les femelles.

Famille: Pelomedusidae Ancien nom: *Emys castanea; Pelusios derbianus; Pelusios seychellensis*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**18-28 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**30-50 ans**
Activité	**Le jour et la nuit**
Mode de vie	**Semi-aquatique**
Habitat	**Savane, forêt tropicale humide et zone humide**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**150 × 75 × 50 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**24-29 °C**
Zone de bain de soleil	**32-36 °C**
Température, nuit	**20-24 °C**
Hygrométrie	**50-80 %**
Eau	**Aquaterrarium** profondeur 15-25 cm
Température de l'eau	**24-27 °C**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes, aliment complet, plantes, vertébrés et vers/escargots**
Détention	**Seul ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**11-27 œufs**
Pontes par an	**1-2**
Incubation	**53-75 jours** à 27-31 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Non évaluée (NE)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Maintenez l'animal dans un grand aquarium ou un bac, non dans un terrarium ordinaire.
TEMPÉRATURE	L'eau doit être à 24-27 °C. Une eau plus chaude rend l'animal agité, et dans une eau plus fraîche il perd l'appétit et cherche la chaleur.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air a peu d'importance pour une tortue aquatique ; 50-80 % dans la pièce convient.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	L'eau doit être maintenue propre, car l'espèce ne mue pas ses plaques écailleuses et la saleté reste donc sur la carapace.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Les UVB sont nécessaires à la vitamine D3 et à l'absorption du calcium, et ils limitent en outre les bactéries sur la carapace.
ALIMENTATION	*Pelusios castaneus* est omnivore, mais penche fortement vers la viande.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Pelusios castaneus* est calme, curieuse et active. Les animaux se rétractent en général lorsqu'on les manipule, mordent rarement, mais peuvent griffer avec leurs griffes acérées pour se libérer.
AIRE D'ORIGINE	Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Angola, République centrafricaine et Sao Tomé-et-Principe.