herpy

TORTUES TERRESTRES ET AQUATIQUES

Tortue léopard

Stigmochelys pardalis

Stigmochelys pardalis est une grande tortue terrestre, calme et herbivore, des savanes d'Afrique, à la haute carapace bombée ornée de taches léopard noires et jaunes. Elle atteint typiquement environ 40 cm et peut vivre 50-100 ans. Elle exige donc un très grand enclos extérieur en été, de la chaleur et des UVB à l'intérieur le reste de l'année, ainsi qu'une alimentation riche en fibres à base d'herbes et de plantes sauvages.

Famille: Testudinidae Nom anglais: Leopard Tortoise Ancien nom: *Geochelone pardalis; Testudo pardalis*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**30-45 cm** longueur totale queue comprise
Poids	**13 000-20 000 g**
Espérance de vie	**50-100 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Semi-désert et savane**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**320 × 160 × 45 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**24-32 °C**
Zone de bain de soleil	**35-40 °C**
Température, nuit	**20-24 °C**
Hygrométrie	**40-70 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Plantes**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**5-30 œufs**
Pontes par an	**1-7**
Incubation	**150-450 jours** à 28-32 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Les adultes ont besoin d'un enclos extérieur lorsque le temps le permet, sous un climat d'Europe du Nord typiquement seulement pendant les mois d'été les plus chauds (voir Température).
TEMPÉRATURE	À l'intérieur, la température doit être de 24-32 °C le jour, de 35-40 °C au coin de bain de soleil et de 20-24 °C la nuit.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'hygrométrie n'est pas documentée pour l'espèce ; 40-70 % dans la fiche est une estimation. L'espèce vient de la savane et de régions semi-arides et n'est pas une espèce humide.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Les UVB ou la lumière naturelle du soleil sont nécessaires, car sinon l'animal ne produit pas de vitamine D3 et ne peut pas absorber et utiliser le calcium. La zone de Ferguson 3 est une estimation.
ALIMENTATION	*S. pardalis* est un brouteur et doit recevoir une alimentation riche en fibres et en calcium.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*S. pardalis* est diurne, craintive et calme. Elle rentre la tête et les pattes lorsqu'on la dérange, mais finit par connaître son soigneur et va vers lui pour recevoir de la nourriture.
AIRE D'ORIGINE	Soudan du Sud, Éthiopie, Somalie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Congo-Kinshasa, Angola, Zambie, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Namibie, Botswana, Afrique du Sud, Eswatini et Lesotho.