herpy

VARANS

## Biak Emerald Monitor

# *Varanus kordensis*

*Varanus kordensis* est un varan arboricole vert et élancé, orné d'un réseau de taches annulaires sombres, qui ne vit que sur l'île de Biak, au nord de la Nouvelle-Guinée. Il appartient à un groupe de varans arboricoles réputés difficiles à maintenir et à reproduire, et il n'existe presque aucune donnée d'entretien détaillée pour cette espèce précise.

Famille: Varanidae  Ancien nom: *Monitor kordensis; Varanus prasinus kordensis*

### INFORMATIONS ESSENTIELLES

#### L'ANIMAL

| | |
|---|---|
| Taille adulte | **70-90 cm**<br>longueur totale queue comprise |
| Espérance de vie | **8-15 ans** |
| Activité | **Le jour** |
| Mode de vie | **Arboricole** |
| Habitat | **Forêt tropicale humide** |
| Difficulté | **Expert** |

#### ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Terrarium min. | **120 × 80 × 180 cm**<br>L × l × H pour 1 adulte |
| Température, jour | **24-34 °C** |
| Zone de bain de soleil | **45-50 °C** |
| Température, nuit | **22-25 °C** |
| Hygrométrie | **75-95 %** |
| UVB | **Recommandés**<br>Zone de Ferguson 2 |
| Alimentation | **Insectes et vertébrés** |
| Détention | **Seul ou en couple** |

#### REPRODUCTION

| | |
|---|---|
| Reproduction | **Ovipare** |
| Maturité sexuelle | **12-24 mois** |
| Taille de la ponte | **2-5 œufs** |
| Pontes par an | **1-3** |
| Incubation | **160-190 jours**<br>à 28-30 °C |

#### PROTECTION ET FORMALITÉS

| | |
|---|---|
| CITES | **Annexe II** |
| Annexe UE | **Annexe B** |
| UICN | **Données insuffisantes (DD)** |

## L'entretien en bref

| | |
|---|---|
| **LE TERRARIUM** | L'entretien de *Varanus kordensis* est presque le même que pour les autres varans arboricoles verts : un grand terrarium haut, avec de nombreuses cachettes, de grosses branches et des tubes de liège. |
| **TEMPÉRATURE** | Les températures sont empruntées à *Varanus beccarii* et constituent une base prudente pour *Varanus kordensis*. De jour, la température doit être de 24-34 °C et la nuit de 22-25 °C. |
| **HYGROMÉTRIE ET EAU** | L'hygrométrie doit être élevée, autour de 75-95 %, et ne doit pas descendre sous 75 %. Des conditions sèches provoquent une déshydratation et des problèmes de mue. |
| **ÉCLAIRAGE ET UVB** | *Varanus kordensis* est diurne et se prélasse dans la canopée. Le besoin en UVB n'est pas connu pour l'espèce, mais les UVB sont recommandés. |
| **ALIMENTATION** | *Varanus kordensis* se nourrit surtout d'insectes. |
| **COMPORTEMENT ET MANIPULATION** | *Varanus kordensis* est si petit qu'une morsure est rarement grave, mais les griffes sont acérées et peuvent causer de profondes lacérations, et la queue sert à agripper, non à fouetter. |
| **AIRE D'ORIGINE** | Indonésie. |