herpy

VARANS

Blue Tree Monitor

Varanus macraei

Varanus macraei est un varan arboricole svelte, à la queue préhensile et au motif de taches oculaires bleues sur fond noir. Il ne vit que sur l'île de Batanta en Indonésie, est menacé dans la nature et exige un terrarium haut, chaud et humide, des insectes vivants et un terrariophile expérimenté.

Famille: Varanidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**80-110 cm** longueur totale queue comprise
Poids	**150-530 g**
Espérance de vie	**8-12 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**120 × 80 × 150 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**29-32 °C**
Zone de bain de soleil	**38-40 °C**
Température, nuit	**22-25 °C**
Hygrométrie	**70-90 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 2
Alimentation	**Insectes, vertébrés et vers/escargots**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**24-26 mois**
Taille de la ponte	**2-7 œufs**
Pontes par an	**1-4**
Incubation	**150-240 jours** à 28,5-31 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	*Varanus macraei* est un varan arboricole, et le terrarium doit donc avant tout être haut. Pour un adulte, la dimension minimale est de 120 × 80 × 150 cm (longueur × largeur × hauteur), et plus grand est mieux.
TEMPÉRATURE	La température diurne dans le terrarium est maintenue à 29-32 °C.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air est maintenue à 70-90 % avec une brumisation quotidienne, de préférence le matin et l'après-midi.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et a besoin d'une lumière intense et d'UVB toute la journée.
ALIMENTATION	*Varanus macraei* mange des insectes vivants : sauterelles, grillons, blattes (par ex. *Blaptica dubia*), vers de farine et vers de farine géants, de temps en temps des vers de terre.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est diurne, timide et nerveuse. Les nouveaux animaux se cachent ou fuient au toucher et peuvent heurter les vitres. Les femelles sont plus anxieuses que les mâles. L'animal ne doit pas être forcé à la manipulation.
AIRE D'ORIGINE	Indonésie.