herpy

VARANS

## Crocodile Monitor

# *Varanus salvadorii*

*Varanus salvadorii* est un varan arboricole pouvant atteindre environ 250 cm de long, originaire des forêts tropicales humides de Nouvelle-Guinée, avec une queue au moins deux fois plus longue que la tête et le corps réunis, et des besoins en espace équivalant à une pièce entière.

Famille: Varanidae

### INFORMATIONS ESSENTIELLES

#### L'ANIMAL

| | |
|---|---|
| Taille adulte | **150-250 cm**<br>longueur totale queue comprise |
| Poids | **2 500-6 000 g** |
| Espérance de vie | **15-25 ans** |
| Activité | **Le jour** |
| Mode de vie | **Arboricole** |
| Habitat | **Forêt tropicale humide** |
| Difficulté | **Expert** |

#### ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Terrarium min. | **300 × 150 × 200 cm**<br>L × l × H pour 1 adulte |
| Température, jour | **28-32 °C** |
| Zone de bain de soleil | **35-40 °C** |
| Température, nuit | **24-26 °C** |
| Hygrométrie | **70-90 %** |
| Eau | **Partie aquatique**<br>profondeur 30-50 cm |
| UVB | **Indispensables**<br>Zone de Ferguson 3 |
| Alimentation | **Insectes et vertébrés** |
| Détention | **Seul ou en couple** |

#### REPRODUCTION

| | |
|---|---|
| Reproduction | **Ovipare** |
| Maturité sexuelle | **24-60 mois** |
| Taille de la ponte | **4-12 œufs** |
| Pontes par an | **1-2** |
| Incubation | **155-251 jours**<br>à 28-30,5 °C |

#### PROTECTION ET FORMALITÉS

| | |
|---|---|
| CITES | **Annexe II** |
| Annexe UE | **Annexe B** |
| UICN | **Préoccupation mineure (LC)** |

## L'entretien en bref

| | |
|---|---|
| **LE TERRARIUM** | La taille est la première exigence qui détermine si l'espèce peut être maintenue de façon responsable. |
| **TEMPÉRATURE** | *Varanus salvadorii* est tropical et diurne, et a besoin d'un grand gradient thermique, d'environ 26 °C du côté frais jusqu'à 35-40 °C aux postes d'insolation. |
| **HYGROMÉTRIE ET EAU** | L'espèce exige une forte humidité de l'air, 70-90 % en permanence, ainsi qu'une bonne ventilation, pour que bactéries et champignons ne s'installent pas. |
| **ÉCLAIRAGE ET UVB** | L'espèce est diurne et se chauffe dans les couches supérieures de la forêt. |
| **ALIMENTATION** | *Varanus salvadorii* est un prédateur, et dans la nature les oiseaux semblent constituer l'alimentation principale, complétée par de petits mammifères, des œufs, des insectes et des lézards. |
| **COMPORTEMENT ET MANIPULATION** | *Varanus salvadorii* est typiquement nerveux et craintif, évite le contact avec l'homme, et certains animaux réagissent de façon agressive. Chaque animal a son propre caractère. |
| **AIRE D'ORIGINE** | Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée. |