herpy

AGAMIDI

Brown Pricklenape

Acanthosaura lepidogaster

Acanthosaura lepidogaster è un agamide forestale di colore da grigio-verde a bruno, con una spina dietro ogni occhio e una bassa cresta di aculei sulla nuca. È diffuso dalla Cina meridionale al Vietnam, al Laos, alla Thailandia e al Myanmar. La specie raggiunge i 20-28 cm, vive tra i cespugli e sul suolo della foresta e richiede un terrario umido e relativamente fresco, in cui l'aria non superi i 28 °C.

Famiglia: Agamidae Nome precedente: *Acanthosaura lamnidentata; Acanthosaura fruhstorferi; Acanthosaura braueri*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**20-28 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**100 × 50 × 100 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**20-26 °C**
Punto caldo	**28-30 °C**
Temperatura, notte	**18-21 °C**
Umidità	**70-90%**
Acqua	**Parte acquatica**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**6-12 uova**
Incubazione	**110-130 giorni** a 25-27 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un adulto richiede un terrario di almeno 100 × 50 × 100 cm (lunghezza × larghezza × altezza). La specie utilizza sia i rami sia il fondo, quindi la superficie di base è importante quanto l'altezza.

TEMPERATURA

Acanthosaura lepidogaster sopporta male il caldo. L'aria nel terrario deve restare a 20-26 °C di giorno e non deve superare i 28 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità deve essere del 70-80 % di giorno e preferibilmente intorno al 90 % di notte. Nebulizza il terrario a fondo con acqua dolce 2-3 volte al giorno, in modo che ci siano gocce su piante e pareti.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è diurna, ma vive all'ombra nella foresta e ha bisogno solo di UVB debole.

ALIMENTAZIONE

La specie si nutre di insetti e altri piccoli animali. Offri una dieta varia di grilli, blatte, cavallette, bachi da seta, lombrichi e piccole lumache nude.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Acanthosaura lepidogaster è un agamide forestale calmo, che spesso resta immobile su un ramo, un tronco o sul fondo. Raramente si muove in fretta.

AREALE D'ORIGINE

Cina, Laos, Myanmar (Birmania), Thailandia e Vietnam.