herpy

AGAMIDI

Green Crested Lizard

Bronchocela cristatella

Bronchocela cristatella è un agamide arboricolo verde chiaro, molto slanciato, delle foreste del Sud-est asiatico, la cui coda supera i tre quarti della lunghezza totale. Raggiunge i 50-58 cm, è diurno e caccia insetti sugli alberi. Può passare da un verde vivo al marrone quando si agita, ed è veloce, ottimo saltatore e timido.

Famiglia: Agamidae Nome precedente: *Calotes cristatellus; Agama cristatella; Agama moluccana*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**50-58 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 150 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**25-30 °C**
Punto caldo	**32-38 °C**
Temperatura, notte	**22-25 °C**
Umidità	**70-90%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**2 uova**
Incubazione	**47-80 giorni** a 27-31 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Bronchocela cristatella*.
TEMPERATURA	La temperatura segue il clima dell'areale. Di giorno nel terrario deve essere di 25-30 °C, e in un punto di basking in alto su un ramo deve esserci una temperatura di 32-38 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità relativa deve essere del 70-90 %, come in una foresta tropicale di pianura. Nebulizza a fondo il terrario due volte al giorno, in modo che foglie e rami siano bagnati.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e si scalda al sole ai margini della foresta e nelle radure, perciò ha bisogno di luce intensa e di UVB.
ALIMENTAZIONE	*Bronchocela cristatella* si nutre di insetti che cattura tra cespugli e alberi, tra cui le formiche.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è timida e si stressa facilmente. Sotto stress diventa marrone e può fuggire tra il fogliame o saltare dai rami. Non si presta alla manipolazione ed è un animale da osservare.
AREALE D'ORIGINE	Malaysia, Singapore, Indonesia, Filippine, Thailandia e Brunei.