herpy

AGAMIDI

Frilled Lizard

Chlamydosaurus kingii

Chlamydosaurus kingii è un grande agamide arboricolo originario dell'Australia settentrionale e della Nuova Guinea meridionale. È noto per l'ampio collare di pelle attorno al collo, che apre a ventaglio in una postura difensiva minacciosa. Raggiunge i 60-90 cm, è diurno e si nutre di insetti. In compenso richiede un terrario molto alto, un forte calore e raggi UVB, ed è timido e soggetto a stress.

Famiglia: Agamidae Nome precedente: *Clamydosaurus kingii*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**60-90 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**400-870 g**
Aspettativa di vita	**8-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Savana e foresta secca**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**150 × 75 × 150 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**27-32 °C**
Punto caldo	**38-42 °C**
Temperatura, notte	**23-27 °C**
Umidità	**60-70%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**24-36 mesi**
Uova per deposizione	**4-20 uova**
Deposizioni all'anno	**2-4**
Incubazione	**70-110 giorni** a 28-29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un adulto richiede un terrario di almeno 150 × 75 × 150 cm (lunghezza × larghezza × altezza). L'altezza è più importante della superficie del fondo, perché la specie è arboricola e poter stare in alto dà sicurezza all'animale.
TEMPERATURA	Il punto di esposizione al sole deve trovarsi nella parte alta del terrario e avere una temperatura superficiale di 38-42 °C, con circa 40 °C come riferimento.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 60-70 % e il terrario va nebulizzato. La specie vive in un clima con piogge intense in estate e beve le gocce d'acqua.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e si espone al sole, quindi ha bisogno di una luce intensa su tutto il terrario e di un punto di esposizione con luce calda e UVB.
ALIMENTAZIONE	*Chlamydosaurus kingii* è insettivoro. L'alimentazione è composta da grilli, scarafaggi, larve di falena, bachi da seta e qualche superverme. Termiti e formiche sono le prede più importanti in natura.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*C. kingii* è tranquillo e stanziale nel terrario, ma timido verso i movimenti nella stanza.
AREALE D'ORIGINE	Australia, Papua Nuova Guinea e Indonesia.