herpy

AGAMIDI

Drago d'acqua cinese

Physignathus cocincinus

Physignathus cocincinus è un grande agamide verde e semi-acquatico che vive lungo i corsi d'acqua delle foreste del Sud-est asiatico. Raggiunge circa 90 cm, di cui più di due terzi sono coda. La specie è diurna, si arrampica e si tuffa, e richiede un terrario molto grande, alto e umido, con una vasca profonda, UVB intensi e un punto di termoregolazione caldo. Gran parte degli animali in commercio è catturata in natura.

Famiglia: Agamidae Nome inglese: Chinese Water Dragon Nome precedente: *Dilophyrus mentager*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**70-90 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**250-600 g**
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e semiacquatico**
Habitat	**Foresta pluviale e zona umida**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**180 × 90 × 180 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**25-30 °C**
Punto caldo	**35-40 °C**
Temperatura, notte	**21-24 °C**
Umidità	**60-80%**
Acqua	**Parte acquatica** profondità 15-30 cm
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti, piante e vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**5-18 uova**
Incubazione	**60-75 giorni** a 29-31 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un singolo adulto richiede un terrario di almeno 180 × 90 × 180 cm (lunghezza × profondità × altezza). La specie è grande e attiva, si arrampica e nuota, e in un terrario più piccolo si stressa e si ferisce.

TEMPERATURA

Il punto di termoregolazione deve essere di 35-40 °C, misurati con un termometro digitale direttamente sul ramo. I giovani devono avere un punto di termoregolazione nella parte bassa dell'intervallo.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere del 60-80 %, massima al mattino (circa 75-80 %) e più bassa la sera (circa 50-60 %).

ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA

La vasca deve essere abbastanza grande da permettere all'animale di tuffarsi e nuotare: profonda almeno 15 cm, meglio di più, e deve coprire da un terzo alla metà del fondo.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è diurna e richiede UVB intensi corrispondenti alla zona 3 di Ferguson. Usa un tubo T5 HO con il 10-12 % di UVB in un'armatura riflettente sullo stesso lato delle lampade riscaldanti.

ALIMENTAZIONE

Physignathus cocincinus è onnivoro, ma si nutre soprattutto di insetti. I giovani mangiano quasi solo insetti, e con l'età si aggiungono più vegetali. Piccoli sotto i 3 mesi: piccoli grilli ogni giorno.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Physignathus cocincinus è timido e sensibile allo stress, soprattutto gli animali catturati in natura.

AREALE D'ORIGINE

Cina, Vietnam, Laos, Cambogia e Thailandia.