herpy

AGAMIDI

Eastern Bearded Dragon

Pogona barbata

Pogona barbata è una delle agame barbute più grandi: un'agama robusta e diurna di 50-65 cm, originaria dei boschi e della macchia dell'Australia orientale, con una barba ben sviluppata e scura e l'interno della bocca giallo. È più territoriale di *Pogona vitticeps*, si arrampica volentieri e richiede un terrario grande, molto calore e UVB.

Famiglia: Agamidae Nome precedente: *Agama barbata; Amphibolurus barbatus; Grammatophora barbata; Stellio discosomus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**50-65 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo, terrestre e scavatore**
Habitat	**Savana e bosco e prato temperati**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**180 × 60 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**22-37 °C**
Punto caldo	**42-45 °C**
Temperatura, notte	**12-24 °C**
Umidità	**30-60%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti e piante**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**12-24 mesi**
Uova per deposizione	**15-35 uova**
Deposizioni all'anno	**2-3**
Incubazione	**55-75 giorni** a 28-30 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

La gestione di *P. barbata* è descritta solo in modo scarso per la specie stessa.

TEMPERATURA

Riscalda con almeno due faretti alogeni sopra la zona di basking. La superficie lì deve essere di 42-45 °C, misurata con un termometro a infrarossi, e il punto caldo deve essere grande almeno quanto l'intero animale, coda compresa.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere in media del 30-60 %, misurata nella parte fresca. Varia naturalmente: più bassa vicino alla zona di basking, più alta di notte e vicino all'acqua.

ILLUMINAZIONE E UVB

Pogona barbata dipende da una luce intensa e bianca, che stimola appetito e attività. Il terrario deve essere molto luminoso e la zona di basking deve essere il punto più luminoso.

ALIMENTAZIONE

P. barbata è onnivora. In natura l'alimentazione è composta da insetti, vermi, piccoli vertebrati e parti di piante. I giovani mangiano soprattutto insetti e gli adulti soprattutto piante.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Pogona barbata è territoriale e lo mostra più chiaramente di *Pogona vitticeps*. Una barba nera e gonfiata, la bocca aperta con l'interno giallo, sibili e un piccolo balzo verso l'avversario sono minacce.

AREALE D'ORIGINE

Australia.