herpy

AGAMIDI

Black-soil Bearded Dragon

Pogona henrylawsoni

Pogona henrylawsoni è il più piccolo dei draghi barbuti: un agamide basso e compatto, lungo al massimo circa 30 cm, originario delle pianure di terreno argilloso nero prive di alberi del Queensland centrale, con una barba poco sviluppata e una testa corta e tozza. È diurno, tranquillo e si accontenta di uno spazio molto più ridotto rispetto a *Pogona vitticeps*, ma ha le stesse esigenze in fatto di calore, UVB intensi e un substrato in cui poter scavare, e vive 10-15 anni.

Famiglia: Agamidae Nome precedente: *Pogona brevis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**25-30 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Semideserto e savana**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**90 × 45 × 45 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-29 °C**
Punto caldo	**38-45 °C**
Temperatura, notte	**13-24 °C**
Umidità	**30-50%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti e piante**
Detenzione	**Singolarmente, in coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**12-24 mesi**
Uova per deposizione	**5-19 uova**
Deposizioni all'anno	**2**
Incubazione	**58-64 giorni** a 29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un singolo adulto ha bisogno di un terrario di almeno 90 × 45 × 45 cm, e più spazio viene sfruttato volentieri. Un piccolo gruppo, ad esempio un maschio con una o più femmine, richiede almeno 120 × 60 × 60 cm.
TEMPERATURA	La zona di basking deve avere una temperatura superficiale di 38-45 °C, misurata con un termometro a infrarossi sulla pietra. La zona fresca deve essere a 24-29 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere in media del 30-50 %, misurata a metà del terrario con un igrometro digitale. Brevi oscillazioni verso l'alto o verso il basso sono innocue.
ILLUMINAZIONE E UVB	*P. henrylawsoni* è diurno e ha bisogno di molta luce bianca intensa e di UVB potenti. Usa un tubo T5 HO con 10-12 % di UVB in un'armatura riflettente sullo stesso lato della lampada riscaldante.
ALIMENTAZIONE	*P. henrylawsoni* è onnivoro e mangia soprattutto insetti e verdure a foglia. Neonati (sotto i 3 mesi): insetti 2-3 volte al giorno e verdure ogni giorno. Giovani (3-7 mesi): insetti due volte al giorno e verdure ogni giorno.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*P. henrylawsoni* è tranquillo e tollera una manipolazione delicata, ma non gradisce essere trattenuto o rovesciato sulla schiena e si dimena se succede.
AREALE D'ORIGINE	Australia.