herpy

AGAMIDI

Abrolhos Bearded Dragon

Pogona minima

Pogona minima è un piccolo agamide barbuto diurno che vive solo sulle isole Wallabi, nell'arcipelago Houtman Abrolhos, al largo della costa dell'Australia Occidentale. Misura circa 11 cm dal muso alla cloaca, ha zampe e coda lunghe e una barba appena accennata. Esistono quasi solo esperienze di allevamento sporadiche, quindi la guida si basa sui parenti più stretti.

Famiglia: Agamidae Nome precedente: *Amphibolurus barbatus minimus; Amphibolurus minimus; Pogona minor minima*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**25-30 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Semideserto**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-37 °C**
Punto caldo	**40-45 °C**
Temperatura, notte	**13-24 °C**
Umidità	**30-50%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti e piante**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**5-19 uova**
Incubazione	**58-64 giorni** a 29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Non valutata (NE)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sull'allevamento di *Pogona minima*, e la specie è quasi priva di descrizioni in cattività.
TEMPERATURA	Riscalda con almeno due faretti alogeni sopra la zona di termoregolazione. La superficie lì deve essere di 40-45 °C, misurata con un termometro a infrarossi, e la zona calda deve essere almeno grande quanto l'intero animale.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 30-50 %, misurata nel lato fresco, e il terrario deve potersi asciugare. Aria stagnante e umida e substrato bagnato causano malattie.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Pogona minima* è diurna e richiede una luce intensa e bianca. La zona di termoregolazione deve essere il punto più luminoso, e il 75-100 % della lunghezza del terrario dovrebbe essere illuminato.
ALIMENTAZIONE	*Pogona minima* si alimenta come *Pogona minor*: soprattutto insetti e una parte minore di verdura. Neonati (sotto i 3 mesi): insetti 2-3 volte al giorno e verdura ogni giorno. Giovani (3-12 mesi): insetti e verdura ogni giorno.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Pogona minima* è diurna e prende molto il sole. Il linguaggio del corpo è noto dalle altre specie di agamidi barbuti: movimenti del capo verso i rivali e saluto con una zampa anteriore in segno di sottomissione.
AREALE D'ORIGINE	Australia.