herpy

AGAMIDI

Western Bearded Dragon

Pogona minor

Pogona minor è un'agama barbuta di taglia media, relativamente snella e diurna, di 30-40 cm, originaria dell'Australia sudoccidentale e centrale, con una barba appena accennata di piccole spine. Vive tra dune, boscaglie e foreste aride, mangia soprattutto insetti e depone più piccole covate di uova all'anno.

Famiglia: Agamidae Nome precedente: *Amphibolurus minor; Pogona loriae*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**30-40 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Semideserto e savana**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-37 °C**
Punto caldo	**40-45 °C**
Temperatura, notte	**13-24 °C**
Umidità	**30-50%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti e piante**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**5-19 uova**
Deposizioni all'anno	**2-4**
Incubazione	**58-64 giorni** a 29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

La gestione di *P. minor* è descritta solo in modo scarno. I valori per terrario, temperatura, umidità, luce, alimentazione e longevità sono presi da *Pogona vitticeps* e dalla più piccola *Pogona henrylawsoni*.

TEMPERATURA

Riscalda con almeno due faretti alogeni sopra il punto di basking. La superficie lì deve essere di 40-45 °C, misurata con un termometro a infrarossi, e la zona calda deve essere grande almeno quanto tutto l'animale.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere del 30-50 %, misurata nella parte fresca, e il terrario deve potersi asciugare, perché la specie vive in zone aride. Aria ferma e umida e fondo bagnato fanno ammalare.

ILLUMINAZIONE E UVB

Pogona minor dipende da una luce intensa e bianca, che favorisce appetito e attività. Il punto di basking deve essere il posto più luminoso, e il 75-100 % della lunghezza del terrario dovrebbe essere illuminato.

ALIMENTAZIONE

Pogona minor è soprattutto insettivora. In natura insetti e altri piccoli animali costituiscono circa l'80 % dell'alimentazione e le parti vegetali circa un quinto.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Pogona minor è diurna e prende molto il sole. L'animale usa il linguaggio del corpo come le altre agame barbute: i maschi annuiscono con la testa davanti ai rivali, e agitare una zampa anteriore è un segno di sottomissione.

AREALE D'ORIGINE

Australia.