herpy

AGAMIDI

North-west Bearded Dragon

Pogona mitchelli

Pogona mitchelli è un agamide barbuto snello e diurno, lungo circa 40 cm, originario delle regioni tropicali dell'Australia nord-occidentale, con una barba poco sviluppata e spine sulla nuca più robuste rispetto a *Pogona minor*. La gestione segue quella dei parenti più stretti: calore, UVB intensi, substrato scavabile e alimentazione basata soprattutto su insetti.

Famiglia: Agamidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**30-40 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Savana**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-37 °C**
Punto caldo	**40-45 °C**
Temperatura, notte	**18-24 °C**
Umidità	**30-60%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti e piante**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**5-19 uova**
Deposizioni all'anno	**2-4**
Incubazione	**58-64 giorni** a 29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Non valutata (NE)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si sa poco sulla gestione di *Pogona mitchelli*. Il clima dell'areale è caldo tutto l'anno, con una breve stagione delle piogge e un lungo periodo secco con notti fresche.
TEMPERATURA	Riscalda con almeno due faretti alogeni sopra la zona di esposizione. La superficie in quel punto deve essere di 40-45 °C, misurata con un termometro a infrarossi, e la zona calda deve essere grande almeno quanto l'intero animale.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 30-60 %, misurata nella zona fresca, e il terrario deve potersi asciugare tra una nebulizzazione e l'altra.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Pogona mitchelli* è diurno e ha bisogno di luce bianca molto intensa e di UVB potenti. Usa un tubo T5 HO con il 10-14 % di UVB in un'armatura riflettente sopra il lato caldo, parallelo alle lampade riscaldanti.
ALIMENTAZIONE	*Pogona mitchelli* viene alimentato soprattutto con insetti e un po' di verdura: Neonati (sotto i 3 mesi): insetti 2-3 volte al giorno e verdura ogni giorno. Giovani (3-12 mesi): insetti e verdura ogni giorno.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Pogona mitchelli* è diurno e fa molto basking. Come altri draghi barbuti usa il linguaggio del corpo: i maschi annuiscono con la testa davanti a rivali e femmine, e agitare una zampa anteriore è segno di sottomissione.
AREALE D'ORIGINE	Australia.