herpy

AGAMIDI

## Drago barbuto centrale

# *Pogona vitticeps*

*Pogona vitticeps* è un agamide robusto e diurno dell'interno arido dell'Australia, con una barba spinosa che gonfia e fa diventare nera quando si sente minacciato. Raggiunge i 45-60 cm ed è uno dei rettili più allevati al mondo. Perdona molti errori, ma richiede un terrario ampio, calore intenso e UVB, verdure per la maggior parte dei pasti e un allevatore pronto a un impegno di 10-15 anni.

Famiglia: Agamidae  Nome inglese: Central Bearded Dragon  Nome precedente: *Amphibolurus vitticeps*

### DATI ESSENZIALI

#### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **45-60 cm**<br>lunghezza totale inclusa la coda |
| Aspettativa di vita | **10-15 anni** |
| Attività | **Di giorno** |
| Stile di vita | **Rupicolo, terrestre e scavatore** |
| Habitat | **Semideserto e savana** |
| Difficoltà | **Intermedio** |

#### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **180 × 60 × 60 cm**<br>L × P × H per 1 adulto |
| Temperatura, giorno | **22-37 °C** |
| Punto caldo | **42-45 °C** |
| Temperatura, notte | **12-24 °C** |
| Umidità | **30-60%** |
| Acqua | **Ciotola d'acqua** |
| UVB | **Indispensabili**<br>Zona Ferguson 3 |
| Alimentazione | **Insetti e piante** |
| Detenzione | **Singolarmente** |

#### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Maturità sessuale | **12-24 mesi** |
| Uova per deposizione | **15-30 uova** |
| Incubazione | **55-75 giorni**<br>a 28-30 °C |

#### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Non elencata** |
| Allegato UE | **Non elencata** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

| | |
|---|---|
| **IL TERRARIO** | Un singolo adulto ha bisogno di un terrario di almeno 180 × 60 × 60 cm. L'altezza dovrebbe essere di 90 cm, se possibile, perché la specie si arrampica molto. |
| **TEMPERATURA** | Riscalda con almeno due faretti alogeni sopra la zona di basking. La superficie lì deve essere di 42-45 °C, misurata con un termometro a infrarossi, e non deve superare i 50 °C. |
| **UMIDITÀ E ACQUA** | L'umidità dell'aria deve essere in media del 30-60 %, misurata all'estremità fredda. Varia in modo naturale: più bassa vicino alla zona di basking, più alta di notte e vicino all'acqua. |
| **ILLUMINAZIONE E UVB** | *Pogona vitticeps* dipende da una luce intensa e bianca: favorisce appetito, attività e benessere, e la specie vede anche gli UVA. Il terrario deve quindi essere molto luminoso. |
| **ALIMENTAZIONE** | *Pogona vitticeps* è onnivora. I giovani mangiano soprattutto insetti, gli adulti soprattutto piante. |
| **COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE** | *Pogona vitticeps* è tranquilla, curiosa e tollera la manipolazione meglio della maggior parte delle lucertole. Lascia che un nuovo animale si abitui al terrario per circa due settimane prima di prenderlo in mano. |
| **AREALE D'ORIGINE** | Australia. |