herpy

AGAMIDI

Sudan Mastigure

Uromastyx dispar

Uromastyx dispar è un uromastice del Sahara e del Sahel con quattro sottospecie, tra cui la grande *U. d. flavifasciata* e la *U. d. maliensis* del Mali, allevata di frequente. La specie raggiunge 28-50 cm a seconda della forma, è erbivora e scava nel substrato profondo. Richiede un terrario ampio, caldo e asciutto con UVB potenti ed è più un animale da osservare che da maneggiare.

Famiglia: Agamidae Nome precedente: *Uromastyx flavifasciata; Uromastyx maliensis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**28-50 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**200-400 g**
Aspettativa di vita	**15-25 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Rupicolo, terrestre e scavatore**
Habitat	**Deserto e terreno roccioso**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**29-35 °C**
Punto caldo	**45-50 °C**
Temperatura, notte	**20-22 °C**
Umidità	**20-30%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Riposo invernale	**18-21 °C** 8-12 settimane
Alimentazione	**Piante**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**36 mesi**
Uova per deposizione	**10-20 uova**
Deposizioni all'anno	**1**
Incubazione	**60-80 giorni** a 33 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un adulto della forma nominale o di *U. d. maliensis* richiede un terrario di almeno 120 × 60 × 60 cm (lunghezza × profondità × altezza), e più grande è meglio.
TEMPERATURA	L'area di termoregolazione deve avere una temperatura superficiale di 45-50 °C, misurata con un termometro a infrarossi subito sotto la lampada. La zona centrale del terrario si trova a 35-38 °C e quella fredda a 29-35 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere inferiore al 30 %. La specie tollera un'umidità un po' più alta, purché il terrario sia abbastanza asciutto e caldo, ma non tollera di stare al freddo e in ambiente umido.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e ha bisogno di luce intensa. Oltre alla lampada riscaldante, usa come luce diurna una lampada LED o un tubo fluorescente da circa 6500 K.
ALIMENTAZIONE	*Uromastyx dispar* è erbivora.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Gli adulti sono territoriali, soprattutto i maschi verso altri maschi, e due maschi non vanno mai tenuti insieme.
AREALE D'ORIGINE	Algeria, Sahara occidentale, Mali, Mauritania, Sudan e Ciad.