herpy

AGAMIDI

Ocellated Spinytail

Uromastyx ocellata

Uromastyx ocellata è un uromastice piccolo e compatto, originario dei deserti rocciosi che circondano la parte meridionale del Mar Rosso. Il dorso è ornato da ocelli chiari e il maschio è più colorato della femmina. La specie raggiunge i 25-30 cm, si nutre di vegetali e scava nel substrato profondo e asciutto. Richiede un terrario caldo e secco con UVB intensi ed è facile da confondere con i suoi parenti più stretti.

Famiglia: Agamidae Nome precedente: *Uromastyx ocellatus; Aporoscelis princeps*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**25-30 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**15-25 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Rupicolo, terrestre e scavatore**
Habitat	**Deserto, semideserto e terreno roccioso**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**27-32 °C**
Punto caldo	**50-55 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**20-30%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Piante**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**36-60 mesi**
Uova per deposizione	**4-20 uova**
Incubazione	**60-70 giorni** a 33-34 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un esemplare adulto ha bisogno di un terrario di almeno 120 × 60 × 60 cm (lunghezza × larghezza × altezza), e più grande è meglio. È più di quanto offrano la maggior parte dei terrari in vetro, quindi scegli un terrario in legno, PVC o plastica con fronte in vetro o ante apribili.

TEMPERATURA

La zona di basking deve avere una temperatura superficiale di 50-55 °C, misurata con un termometro a infrarossi subito sotto la lampada. Il lato fresco si mantiene a 27-32 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere bassa, circa 20-30 %, misurata al suolo nel lato fresco. Un'umidità elevata e prolungata fa ammalare l'animale, quindi non nebulizzare il terrario.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è diurna e ha bisogno di una luce intensa. Usa una lampada LED o un tubo fluorescente da circa 6500 K come luce diurna, separata dalla fonte di calore; gli animali sono più attivi e mangiano meglio.

ALIMENTAZIONE

Uromastyx ocellata è erbivora. Circa il 90 % del cibo deve essere costituito da verdure a foglia e fiori, circa il 5 % da ortaggi duri e circa il 5 % da alimenti secchi.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Gli adulti sono tranquilli e stanziali, ma territoriali nei confronti dei conspecifici, soprattutto i maschi verso altri maschi. Tienili singolarmente.

AREALE D'ORIGINE

Egitto, Sudan, Eritrea, Gibuti, Etiopia e Somalia.