herpy

ANGUIDI

Fringed Arboreal Alligator Lizard

Abronia fimbriata

Abronia fimbriata è un'abronia arboricola di colore bruno, con scaglie simili a spine sopra l'orecchio, originaria delle foreste nebulose degli altopiani nordorientali del Guatemala. Raggiunge circa 25-35 cm, è vivipara e si nutre di insetti. Richiede un terrario alto e ben ventilato, con muschio e bromelie, e temperature fresche. La specie è minacciata e la sua gestione in cattività è descritta solo in modo frammentario.

Famiglia: Anguidae Nome precedente: *Barissia fimbriata; Gerrhonotus fimbriatus*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**25-35 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-20 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta montana**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**50 × 50 × 75 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**20-27 °C**
Punto caldo	**26-30 °C**
Temperatura, notte	**10-18 °C**
Umidità	**60-80%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Maturità sessuale	**24-36 mesi**
Piccoli per parto	**4 piccoli**
Deposizioni all'anno	**1**
Gestazione	**180-240 giorni**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice I**
Allegato UE	**Allegato A**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	La gestione di *Abronia fimbriata* è descritta solo in modo frammentario e i valori qui riportati sono presi dalla specie strettamente imparentata *Abronia graminea*, la più conosciuta del genere.
TEMPERATURA	*Abronia fimbriata* non tollera il caldo. La temperatura diurna deve essere di 20-27 °C e il punto di basking sotto un faretto debole può essere di 26-30 °C. L'animale è più attivo a 24-27 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità relativa dell'aria deve essere del 60-80 %, con i valori più alti di notte e dopo la nebulizzazione.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e ha bisogno di UVB.
ALIMENTAZIONE	*Abronia fimbriata* si nutre di insetti e altri piccoli animali. Offri grilli, cavallette, tarme della farina, blatte, lumache, ragni e larve morbide, per esempio bruchi verdi e larve di mosca ad alto contenuto di calcio.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è silenziosa e timida. L'animale passa la maggior parte della giornata fermo su un ramo o in una bromelia e si scalda al sole per brevi periodi. Non è un animale da maneggiare.
AREALE D'ORIGINE	Guatemala.