herpy

ANGUIDI

Orbettino

Anguis fragilis

Anguis fragilis è una lucertola lucida e priva di zampe, lunga 40-50 cm, che vive nascosta sotto pietre, legno e vegetazione fitta nell'Europa occidentale e centrale. Somiglia a un serpente, ma ha le palpebre e può staccare la coda. Si nutre di lumache e lombrichi, partorisce piccoli vivi e può diventare molto longeva. Richiede un terrario fresco e umido oppure un recinto all'aperto con substrato profondo, molti nascondigli e un vero periodo di riposo invernale.

Famiglia: Anguidae Nome inglese: Slow Worm

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**40-50 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**20-100 g**
Aspettativa di vita	**20-30 anni**
Attività	**Di giorno e al crepuscolo**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Bosco e prato temperati**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**80 × 40 × 40 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**18-24 °C**
Punto caldo	**25-30 °C**
Temperatura, notte	**10-15 °C**
Umidità	**60-80%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Facoltativi**
Riposo invernale	**4-8 °C** 16-20 settimane
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**In coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Maturità sessuale	**36-48 mesi**
Piccoli per parto	**6-12 piccoli**
Deposizioni all'anno	**1**
Gestazione	**80-100 giorni**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	La gestione di *Anguis fragilis* è descritta solo in modo scarso, ma la specie è rustica e si riproduce volentieri quando le condizioni sono giuste. I valori qui riportati si basano sul modo di vivere e sul clima della specie.
TEMPERATURA	La specie non tollera il caldo intenso. La temperatura diurna deve essere di 18-24 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 60-80 %. Il substrato deve essere leggermente umido in profondità, ma mai bagnato, e lo strato superiore può asciugarsi un po' tra una nebulizzazione e l'altra.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è più attiva al mattino e al crepuscolo e si scalda soprattutto in modo indiretto.
ALIMENTAZIONE	*Anguis fragilis* si nutre di prede lente e preferisce, più di ogni altra cosa, le piccole limacce grigie dei campi. Accetta anche altre limacce, lombrichi, larve di tipula, larve di mosca, ragni e piccole lumache con guscio.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Anguis fragilis* è tranquilla e passa la maggior parte del tempo nel substrato o nei nascondigli, spesso con solo la testa che spunta.
AREALE D'ORIGINE	Norvegia, Svezia, Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Cechia, Polonia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord.