herpy

ANGUIDI

Mostro di Gila

Heloderma suspectum

Heloderma suspectum è una lucertola robusta e lenta dei deserti degli Stati Uniti sudoccidentali e del Messico nordoccidentale, nera con bande rosa o gialle e ricoperta di scaglie a forma di perla. È velenosa: un morso è un'emergenza medica acuta e la specie richiede esperienza, routine rigorose e una manipolazione sicura. Raggiunge i 35-55 cm, scava, si nutre di uova e piccoli vertebrati e può vivere più di 20 anni.

Famiglia: Helodermatidae Nome inglese: Gila Monster

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**35-55 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**500-800 g**
Aspettativa di vita	**20-30 anni**
Attività	**Di giorno e al crepuscolo**
Stile di vita	**Rupicolo, terrestre e scavatore**
Habitat	**Deserto, semideserto e terreno roccioso**
Difficoltà	**Specialista**

CURA

Terrario min.	**150 × 70 × 50 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**22-32 °C**
Temperatura, notte	**20-24 °C**
Umidità	**40-60%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Riposo invernale	**10-15 °C** 13-17 settimane
Alimentazione	**Vertebrati**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**36-60 mesi**
Uova per deposizione	**3-7 uova**
Deposizioni all'anno	**1**
Incubazione	**134-155 giorni** a 26-29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Quasi minacciata (NT)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un animale adulto richiede un terrario di almeno 150 × 70 × 50 cm (lunghezza × larghezza × altezza). La misura è una stima basata sulle dimensioni e sullo stile di vita dell'animale.
TEMPERATURA	Di giorno il terrario deve avere un gradiente da 22 °C nella zona fresca a 32 °C sotto la lampada riscaldante, in modo che l'animale possa scegliere. Gli animali attivi mantengono una temperatura corporea intorno ai 30 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria è del 40-60 % e una parte del fondo viene mantenuta leggermente umida, in modo che l'animale possa scavare in terra più umida.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è attiva di giorno e al crepuscolo. La luce resta accesa 10-13 ore al giorno, per il periodo più breve prima e dopo il riposo invernale e spenta durante lo stesso.
ALIMENTAZIONE	In natura la specie mangia piccoli mammiferi, piccoli prelevati dai nidi, uccelli, lucertole, serpenti, rane e insetti e soprattutto uova di uccelli e rettili.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	SICUREZZA: l'animale è velenoso e l'errore più grave è fidarsi del fatto che sia lento e docile. Un morso arriva senza preavviso, anche da un animale che per anni ha preso il cibo dalla pinza.
AREALE D'ORIGINE	Stati Uniti e Messico.