herpy

ANGUIDI

Checkerboard Worm Lizard

Trogonophis wiegmanni

Trogonophis wiegmanni è una piccola anfisbena priva di zampe originaria di Marocco, Algeria e Tunisia, che trascorre tutta la vita interrata nel terreno sabbioso e sotto le pietre. L'animale misura 12-18 cm dal muso alla cloaca, ha una coda corta e conica e un disegno a scacchiera. La specie partorisce piccoli vivi e richiede un substrato profondo e leggermente umido, calore uniforme dal basso e tranquillità. Le conoscenze sulla sua gestione sono scarse.

Famiglia: Trogonophidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**12-18 cm** lunghezza muso-cloaca
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Scavatore**
Habitat	**Semideserto e bosco e prato temperati**
Difficoltà	**Specialista**

CURA

Terrario min.	**40 × 30 × 30 cm** L × P × H per 2 adulti
Temperatura, giorno	**20-25 °C**
Temperatura, notte	**15-20 °C**
Umidità	**50-70%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Maturità sessuale	**30 mesi**
Piccoli per parto	**2-5 piccoli**
Deposizioni all'anno	**1**
Gestazione	**120-150 giorni**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Le conoscenze sulla gestione di *Trogonophis wiegmanni* sono scarse.
TEMPERATURA	Gli animali si scaldano stando interrati nel terreno riscaldato e non al calore della luce.
UMIDITÀ E ACQUA	Conta l'umidità del substrato, non quella dell'aria. Il substrato deve essere leggermente umido fino in fondo: deve mantenere la forma quando lo si stringe in mano, ma senza gocciolare. Nebulizza il substrato con acqua ogni giorno.
ILLUMINAZIONE E UVB	Gli animali stanno interrati e non si vedono alla luce. I raggi UVB non sono necessari.
ALIMENTAZIONE	*Trogonophis wiegmanni* è un carnivoro che mangia insetti e altri piccoli invertebrati terricoli. In natura le prede preferite sono le larve di insetti e le lumache, mentre formiche e porcellini di terra vengono quasi ignorati.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Trogonophis wiegmanni* si vede raramente. Gli animali restano interrati e vengono fuori solo sotto la lastra. È normale. Non scavare per controllarli, perché il disturbo e lo stress li rendono meno attivi.
AREALE D'ORIGINE	Marocco, Algeria e Tunisia.