herpy

CAMALEONTI

Brown Leaf Chameleon

Brookesia superciliaris

Brookesia superciliaris è uno dei camaleonti delle foglie più grandi e raggiunge i 9-10 cm in totale. Vive nella lettiera di foglie delle foreste pluviali orientali del Madagascar, è marrone come una foglia secca e ha grandi tubercoli ossei sopra gli occhi. La specie si mantiene in un terrario piccolo e umido, con un profondo strato di foglie secche e prede di piccole dimensioni. Ha fama di essere difficile, ma oggi viene riprodotta con regolarità, anche se in piccoli numeri.

Famiglia: Chamaeleonidae Nome precedente: *Chamaeleo superciliaris*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**9-10 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**2-4 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo e terrestre**
Habitat	**Foresta pluviale e foresta montana**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**40 × 30 × 40 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**20-25 °C**
Temperatura, notte	**16-20 °C**
Umidità	**70-95%**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 1
Alimentazione	**Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**4-5 mesi**
Uova per deposizione	**2-5 uova**
Deposizioni all'anno	**2-3**
Incubazione	**45-120 giorni** a 18-27 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Si hanno solo poche conoscenze complessive sulla gestione di *Brookesia superciliaris*.
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 20-25 °C e quella notturna di 16-20 °C, come nella foresta pluviale degli altopiani. Il calo notturno avviene da sé quando si spengono le lampade.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 70-95 %, al massimo subito dopo la nebulizzazione e di notte. Nebulizza a fondo il terrario con acqua tiepida almeno due volte al giorno.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e vive all'ombra.
ALIMENTAZIONE	La specie mangia piccoli insetti: drosophile, collemboli, piccoli grilli, tarme della farina e piccole blatte. La preda non deve superare circa il 20 % della lunghezza del corpo dell'animale.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie si tiene da sola. È timida ma vivace e si stressa facilmente per disturbo e contatto, quindi non va presa in mano. In caso di pericolo può vibrare.
AREALE D'ORIGINE	Madagascar.