herpy

CAMALEONTI

Carpet Chameleon

Furcifer lateralis

Furcifer lateralis è un piccolo camaleonte dai colori vivaci, originario delle foreste, dei cespuglieti e dei giardini del Madagascar. La femmina ha una livrea particolarmente marcata, soprattutto quando è gravida. La specie raggiunge appena 17-25 cm, matura in pochi mesi e vive solo 2-3 anni; le sue dimensioni contenute ne fanno un camaleonte gestibile per l'allevatore esperto.

Famiglia: Chamaeleonidae Nome precedente: *Chamaeleo lateralis; Chamaeleo lambertoni*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**17-25 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**2-3 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Savana e foresta pluviale**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-29 °C**
Punto caldo	**32-35 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**60-100%**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**3-6 mesi**
Uova per deposizione	**6-23 uova**
Deposizioni all'anno	**3-6**
Incubazione	**150-400 giorni** a 20-25 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un adulto richiede un terrario di almeno 45 × 45 × 60 cm (lunghezza × larghezza × altezza).
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 24-29 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 60-100 %. Il terrario può asciugarsi durante la giornata, purché l'aria resti relativamente umida e l'animale possa bere ogni giorno.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e amante del sole, quindi richiede luce intensa e UVB. Usa un tubo T5 HO da 6500 K per la luce e un tubo UVB che garantisca la zona 3 della scala Ferguson sulla zona di sole.
ALIMENTAZIONE	*F. lateralis* è un insettivoro stretto. La preda deve essere lunga più o meno quanto la distanza tra gli occhi; le tarme della farina possono essere più lunghe.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie si tiene singolarmente. I maschi sono aggressivi e territoriali e le femmine si stressano facilmente. Gli animali possono mordersi a vicenda, quindi l'accoppiamento va sorvegliato e gli animali separati al termine.
AREALE D'ORIGINE	Madagascar.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/camaleonti/furcifer-lateralis