herpy

CAMALEONTI

Lesser Chameleon

Furcifer minor

Furcifer minor è un piccolo camaleonte degli altopiani centrali del Madagascar. Il maschio è beige e marrone, con due corni nasali, mentre la femmina è quella colorata, soprattutto quando è gravida. La specie raggiunge i 16-23 cm in totale, è minacciata in natura ed è rara in cattività. Richiede un allevatore con esperienza di camaleonti, soprattutto perché le femmine vanno incontro facilmente a problemi di deposizione.

Famiglia: Chamaeleonidae Nome precedente: *Chamaeleo minor*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**16-23 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**2-4 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Savana, foresta secca e foresta montana**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**21-26 °C**
Punto caldo	**32-38 °C**
Temperatura, notte	**15-20 °C**
Umidità	**60-100%**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**5-9 mesi**
Uova per deposizione	**4-18 uova**
Deposizioni all'anno	**1-3**
Incubazione	**190-270 giorni** a 22-24 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un adulto richiede un terrario di almeno 45 × 45 × 60 cm (lunghezza × larghezza × altezza). La specie è piccola e non ha bisogno di un terrario grande, ma alcuni animali sono più irrequieti e stanno meglio con più spazio.
TEMPERATURA	La temperatura diurna deve essere di 21-26 °C. Usa una zona di basking di 32-38 °C, misurata come temperatura superficiale con un termometro a infrarossi, e lascia il fondo più fresco.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere del 60-100 %. La specie proviene da una zona con umidità elevata, ma il terrario deve asciugarsi nel corso della giornata per evitare ristagni d'acqua e malattie.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e amante del sole e richiede una luce intensa. Usa un tubo T5 da 6500 K per l'illuminazione e un tubo UVB che dia la zona 3 della scala Ferguson sulla zona di basking; la zona è mutuata da *Furcifer pardalis*.
ALIMENTAZIONE	*F. minor* è un insettivoro stretto. Offri una dieta varia: grilli, scarafaggi, tenebrionidi e moscerini della frutta.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie si tiene da sola e si uniscono due animali solo per l'accoppiamento. Gli animali sono aggressivi verso i conspecifici, compresi i giovani, e possono farsi seri danni.
AREALE D'ORIGINE	Madagascar.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/camaleonti/furcifer-minor