herpy

CAMALEONTI

Usambara Soft-horned Chameleon

Kinyongia tenuis

Kinyongia tenuis è un camaleonte piccolo e slanciato, originario dei monti Usambara in Tanzania e delle Shimba Hills in Kenya. Ha colori bruni e grigi, coda e zampe lunghe, e vive in alto nella foresta pluviale umida e fresca. La specie depone uova. È rara in cattività e la sua gestione è descritta solo in modo frammentario.

Famiglia: Chamaeleonidae Nome precedente: *Bradypodion tenue; Kinyongia tenue; Chamaeleo tenuis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**15 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-7 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 90 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**20-25 °C**
Punto caldo	**26-28 °C**
Temperatura, notte	**14-18 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**9-12 mesi**
Uova per deposizione	**12-20 uova**
Incubazione	**240-330 giorni** a 17-23 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	La specie è rara in cattività e la sua gestione è descritta solo in modo frammentario. Questa guida si basa sul clima dell'areale e sulle specie meglio conosciute della stessa zona, *Kinyongia fischeri* e *Trioceros deremensis*.
TEMPERATURA	Di giorno ci devono essere 20-25 °C con un punto di sole moderato a 26-28 °C, mentre di notte la temperatura deve scendere a 14-18 °C. Evita temperature superiori a 30 °C. Mantieni l'aria in movimento, in modo che non ristagni.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere alta, 70-100 %, con i valori massimi di notte e al mattino. L'animale beve le gocce e non ha bisogno di una ciotola per l'acqua.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e richiede un terrario luminoso, ma non troppo caldo. Si consiglia l'UVB, e la zona 2 di Ferguson è una stima per un camaleonte di foresta.
ALIMENTAZIONE	*Kinyongia tenuis* mangia insetti. Grilli, blatte, bachi da seta e piccole cavallette di taglia adeguata sono adatti, come per le specie affini. Gli insetti da pasto devono essere di allevamento e nutriti con un alimento ricco.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	I camaleonti si stressano facilmente se maneggiati, e ciò vale probabilmente anche per *Kinyongia tenuis*. Non prendere l'animale in mano senza motivo.
AREALE D'ORIGINE	Kenya e Tanzania.