herpy

CAMALEONTI

Usambara Soft-horned Chameleon

Kinyongia tenuis

Kinyongia tenuis è un camaleonte piccolo e slanciato, originario dei monti Usambara in Tanzania e delle Shimba Hills in Kenya. Ha colori bruni e grigi, coda e zampe lunghe, e vive in alto nella foresta pluviale umida e fresca. La specie depone uova. È rara in cattività e la sua gestione è descritta solo in modo frammentario.

Famiglia: Chamaeleonidae Nome precedente: *Bradypodion tenue; Kinyongia tenue; Chamaeleo tenuis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**15 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-7 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta pluviale**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 90 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**20-25 °C**
Punto caldo	**26-28 °C**
Temperatura, notte	**14-18 °C**
Umidità	**70-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**9-12 mesi**
Uova per deposizione	**12-20 uova**
Incubazione	**240-330 giorni** a 17-23 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La specie

Kinyongia tenuis è un camaleonte piccolo e slanciato del genere *Kinyongia*. I colori sono bruni e grigi. Il nome della specie è il latino per "sottile, slanciato" e si riferisce alla coda più lunga e alle zampe più lunghe rispetto alla simile *Calumma nasutum* del Madagascar.

La lunghezza totale massima, coda compresa, è di circa 15 cm, per cui la specie rientra tra i camaleonti piccoli. Dimensioni e peso non sono documentati per ciascun sesso.

La specie fu originariamente descritta nel genere *Chamaeleo* e in seguito è stata collocata in *Bradypodion*, prima di passare a *Kinyongia*.

Distribuzione e habitat

Kinyongia tenuis vive sui monti Usambara, nel nordest della Tanzania, e nelle Shimba Hills, nel sudest del Kenya. La località tipica è Derema, sui monti Usambara. Nelle Shimba Hills la specie è nota solo da pochi ritrovamenti. È considerata minacciata (EN). Nel 2010 la Tanzania non aveva alcuna quota di esportazione per gli animali catturati in natura di questa specie.

Leggi di più: Acquisto di animali: allevati in cattività, catturati in natura e trasporto

> **Areale d'origine:** Kenya e Tanzania.

HABITAT

La specie abita la foresta pluviale e si trova fino a circa 1.000 m di altitudine. Il clima è fresco e umido, con oltre 2.000 mm di precipitazioni all'anno. C'è una breve stagione delle piogge da metà novembre a inizio gennaio e una stagione delle piogge principale da marzo a maggio, seguita da una stagione secca da giugno a ottobre.

Kinyongia tenuis vive sia all'interno della foresta sia lungo il margine e sta in alto nella vegetazione, in media oltre 4 m da terra.

Nella stessa area vivono le più conosciute *Kinyongia fischeri* e *Trioceros deremensis*, ed è a queste che si rifà la gestione.

Cura

IL TERRARIO

La specie è rara in cattività e la sua gestione è descritta solo in modo frammentario. Questa guida si basa sul clima dell'areale e sulle specie meglio conosciute della stessa zona, *Kinyongia fischeri* e *Trioceros deremensis*. I valori sono presi da queste o stimati in base al clima.

Un adulto ha bisogno di un terrario di almeno 60 × 45 × 90 cm (lunghezza × larghezza × altezza). Più grande è meglio, soprattutto in altezza, perché la specie vive in alto sugli alberi. Va tenuta singolarmente.

Allestisci il terrario in modo fitto, con piante, rametti e rami a varie altezze, così che l'animale possa ritirarsi tra il fogliame. Un terrario in vetro e rete garantisce ventilazione e trattiene al tempo stesso l'umidità, mentre uno scarico sul fondo elimina l'acqua in eccesso.

Leggi di più: Umidità, nebulizzazione e ventilazione

TEMPERATURA

Di giorno ci devono essere 20-25 °C con un punto di sole moderato a 26-28 °C, mentre di notte la temperatura deve scendere a 14-18 °C. Evita temperature superiori a 30 °C. Mantieni l'aria in movimento, in modo che non ristagni. Misura la temperatura superficiale del ramo soleggiato con un termometro a infrarossi.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere alta, 70-100 %, con i valori massimi di notte e al mattino. L'animale beve le gocce e non ha bisogno di una ciotola per l'acqua. Usa un impianto a goccia o a pioggia oppure un nebulizzatore e fai in modo che rami e foglie si asciughino durante la giornata, per evitare muffe e lesioni ai piedi. L'acqua distillata o ad osmosi inversa mantiene puliti gli ugelli.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è diurna e richiede un terrario luminoso, ma non troppo caldo. Si consiglia l'UVB, e la zona 2 di Ferguson è una stima per un camaleonte di foresta. Posiziona il tubo in modo che l'animale possa scegliere tra luce e ombra, e tieni la luce accesa 10-12 ore al giorno.

Leggi di più: Luce e UVB

ALIMENTAZIONE

Kinyongia tenuis mangia insetti. Grilli, blatte, bachi da seta e piccole cavallette di taglia adeguata sono adatti, come per le specie affini. Gli insetti da pasto devono essere di allevamento e nutriti con un alimento ricco. Quantità di cibo e integratori non sono documentati per la specie. Nei camaleonti affini il cibo si spolvera con calcio un paio di volte a settimana, mentre la D3 si somministra solo con parsimonia.

Leggi di più: Animali da pasto: gestione e allevamento Leggi di più: Calcio, vitamine e integratori

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

I camaleonti si stressano facilmente se maneggiati, e ciò vale probabilmente anche per *Kinyongia tenuis*. Non prendere l'animale in mano senza motivo. La specie cerca le zone alte e deve avere i suoi rami fissi per dormire nella parte superiore del terrario. Se l'animale smette di mangiare, va portato da un veterinario esperto di rettili.

Riproduzione

MATURITÀ SESSUALE E SESSAGGIO

La maturità sessuale non è documentata per la specie. Nelle specie di montagna affini del genere *Kinyongia* si raggiunge dopo circa 9-12 mesi.

ACCOPPIAMENTO

L'accoppiamento in cattività non è documentato per la specie. Nelle specie di montagna affini la femmina viene messa con il maschio. Se è ricettiva, tollera i suoi approcci senza aggressività; se lo rifiuta, gli animali vanno separati subito. I maschi non devono potersi vedere. Tutto questo è preso dal gruppo di *Kinyongia fischeri*.

DEPOSIZIONE E COVATE

La specie depone uova. La dimensione della covata non è documentata; il valore nella scheda è preso dal gruppo di *Kinyongia fischeri* ed è probabilmente troppo alto per una specie così piccola. Nelle specie affini di *Kinyongia* la femmina scava una volta in una miscela umida di terra e sabbia e depone le uova in fondo al tunnel.

INCUBAZIONE

Durata e temperatura di incubazione non sono documentate per la specie. I valori nella scheda sono presi dal gruppo di *Kinyongia fischeri*: 8-11 mesi di incubazione a 17-23 °C, più fresco di notte. Le uova si interrano per due terzi in vermiculite leggermente umida in un contenitore chiuso e non vanno girate.

Leggi di più: Incubazione delle uova

ALLEVAMENTO DEI PICCOLI

L'allevamento dei piccoli non è documentato per la specie. Nelle specie di montagna affini i piccoli vivono in gruppetti per i primi 2-3 mesi e poi separatamente, in un terrario un po' più fresco e molto umido, e ricevono piccoli insetti con calcio e vitamine.

Salute ed errori comuni

Non esistono conoscenze documentate sulle malattie di *Kinyongia tenuis*. I problemi tipici dei camaleonti di montagna sono:

- Surriscaldamento dovuto a lampade troppo calde e temperature troppo alte.
- Disidratazione dovuta a umidità troppo bassa e a poche possibilità di bere.
- Parassiti intestinali, soprattutto negli animali catturati in natura.
- Infezioni delle vie respiratorie con aria stagnante.
- Malattia metabolica delle ossa per carenza di UVB e calcio.
- Lesioni e muffe su rami bagnati per tutto il giorno.

Contatta un veterinario esperto di rettili se l'animale smette di mangiare, diventa scuro e letargico o respira con la bocca aperta. La longevità non è documentata per la specie; il valore nella scheda è preso dalla altrettanto piccola *Kinyongia multituberculata*.

Leggi di più: Malattie tipiche e segni di malattia

Chiedi sempre a chi se ne intende

Questa guida è un buon punto di partenza, ma non può sostituire l’esperienza. Gli animali sono diversi uno dall’altro, e gran parte di ciò che conta di più si impara da chi alleva la specie da anni. Parla con un allevatore, un detentore esperto o un veterinario che conosca rettili e anfibi prima di prendere l’animale - e di nuovo se qualcosa non ti convince.

La guida completa con mappa e aggiornamenti: herpy.org/it/camaleonti/kinyongia-tenuis