herpy

CAMALEONTI

## Spectral Pygmy Chameleon

# *Rhampholeon spectrum*

*Rhampholeon spectrum* è un piccolo camaleonte simile a una foglia, lungo 7-10 cm, del sottobosco dell'Africa occidentale e centrale. Ha una colorazione dal verde-bruno al grigio, come una foglia morta, con due strisce scure oblique sui fianchi e un piccolo lembo cutaneo morbido sul muso. Si tiene in un terrario piccolo, umido e fittamente piantumato, con foglie secche in abbondanza. Le conoscenze sull'allevamento sono scarse, perciò i valori si basano su parenti stretti.

Famiglia: Chamaeleonidae  Nome precedente: *Brookesia spectrum; Chamaeleo spectrum; Rhampholeon affinis*

**DATI ESSENZIALI**

### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **7-10 cm**<br>lunghezza totale inclusa la coda |
| Aspettativa di vita | **2-4 anni** |
| Attività | **Di giorno** |
| Stile di vita | **Arboricolo e terrestre** |
| Habitat | **Foresta pluviale e foresta montana** |
| Difficoltà | **Esperto** |

### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **40 × 30 × 40 cm**<br>L × P × H per 1 adulto |
| Temperatura, giorno | **20-25 °C** |
| Temperatura, notte | **16-20 °C** |
| Umidità | **70-95%** |
| UVB | **Consigliati**<br>Zona Ferguson 1 |
| Alimentazione | **Insetti e piccoli invertebrati (collemboli, moscerini della frutta)** |
| Detenzione | **Singolarmente** |

### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Ovipara** |
| Maturità sessuale | **3-9 mesi** |
| Uova per deposizione | **2-5 uova** |
| Incubazione | **150-210 giorni**<br>a 18-23 °C |

### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendice II** |
| Allegato UE | **Allegato B** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

| | |
|---|---|
| **IL TERRARIO** | Si hanno poche conoscenze sull'allevamento di *Rhampholeon spectrum*. |
| **TEMPERATURA** | La temperatura diurna deve essere di 20-25 °C e quella notturna di 16-20 °C. Il calo notturno avviene da sé quando si spengono le lampade. |
| **UMIDITÀ E ACQUA** | L'umidità deve essere del 70-95 % di giorno e dell'80-95 % di notte. Nebulizza il terrario a fondo almeno due volte al giorno, al mattino e di nuovo la sera, con acqua tiepida. |
| **ILLUMINAZIONE E UVB** | La specie è diurna e vive all'ombra, quindi la luce deve somigliare a quella soffusa della foresta. |
| **ALIMENTAZIONE** | La specie mangia piccoli insetti e altri artropodi: moscerini della frutta, piccoli grilli, tenebrioni, punteruoli del grano, piccole blatte e collemboli per i più giovani. |
| **COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE** | La specie si tiene singolarmente. L'aggressività tra conspecifici è bassa, ma due animali insieme stressano facilmente quello inferiore, perciò si uniscono solo per l'accoppiamento. |
| **AREALE D'ORIGINE** | Camerun, Congo-Brazzaville, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Gabon e Nigeria. |