herpy

CAMALEONTI

Von Hoehnel's Chameleon

Trioceros hoehnelii

Trioceros hoehnelii è un piccolo camaleonte viviparo degli altipiani freschi di Kenya e Uganda, dove di notte le temperature possono avvicinarsi allo zero. Il maschio ha un casco alto e un corno sul muso. La specie è resistente al freddo, ma sopporta male il caldo, quindi richiede un terrario fresco, con un netto calo di temperatura durante la notte e un'elevata umidità notturna.

Famiglia: Chamaeleonidae Nome precedente: *Chamaeleo hoehnelii; Chamaeleo bergeri; Chamaeleo leikipiensis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**18-25 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**15-70 g**
Aspettativa di vita	**5-6 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta montana**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**60 × 45 × 90 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**20-22 °C**
Punto caldo	**24-25 °C**
Temperatura, notte	**8-14 °C**
Umidità	**50-100%**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Vivipara**
Maturità sessuale	**12 mesi**
Piccoli per parto	**4-22 piccoli**
Deposizioni all'anno	**1-2**
Gestazione	**120-180 giorni**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un esemplare adulto richiede un terrario di almeno 60 × 45 × 90 cm (lunghezza × larghezza × altezza). La misura deriva da piccoli camaleonti di montagna simili del genere *Trioceros* ed è un minimo.

TEMPERATURA

La specie proviene da altopiani freschi e sopporta male il caldo. La temperatura diurna nel terrario deve essere di 20-22 °C, con un punto di insolazione di 24-25 °C. I giovani possono morire se la temperatura sale oltre.

UMIDITÀ E ACQUA

La notte è il momento umido della specie. L'umidità dell'aria deve salire verso il 100 % di notte, con nebbia da un nebulizzatore a ultrasuoni per circa tre ore a fine notte e al primo mattino.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è diurna e ha bisogno di molta luce. Fornisci 12 ore di luce al giorno tutto l'anno. Un tubo T5 HO da 6500 K o una potente lampada LED sulla larghezza del terrario garantisce la luce generale. I raggi UVB sono necessari.

ALIMENTAZIONE

T. hoehnelii è insettivoro e accetta la maggior parte degli insetti di dimensioni adeguate.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

La specie va tenuta singolarmente. I maschi sono molto aggressivi tra loro e verso specie simili: sibilano, si gonfiano e diventano neri, quindi i maschi non devono potersi vedere.

AREALE D'ORIGINE

Kenya e Uganda.