herpy

CAMALEONTI

## Camaleonte di Jackson

# *Trioceros jacksonii*

*Trioceros jacksonii* è un camaleonte di taglia media delle foreste montane del Kenya e della Tanzania. Il maschio porta tre corna rivolte in avanti e la femmina partorisce piccoli vivi invece di deporre uova. La specie richiede notti fresche, un'elevata umidità notturna e una gestione accurata, quindi è adatta soprattutto a un allevatore esperto.

Famiglia: Chamaeleonidae  Nome inglese: Jackson's Chameleon  Nome precedente: *Chamaeleo jacksonii; Chamaeleon jacksonii*

### DATI ESSENZIALI

#### L'ANIMALE

| | |
|---|---|
| Dimensioni da adulto | **15-38 cm**<br>lunghezza totale inclusa la coda |
| Aspettativa di vita | **5-9 anni** |
| Attività | **Di giorno** |
| Stile di vita | **Arboricolo** |
| Habitat | **Foresta montana** |
| Difficoltà | **Intermedio** |

#### CURA

| | |
|---|---|
| Terrario min. | **60 × 60 × 120 cm**<br>L × P × H per 1 adulto |
| Temperatura, giorno | **20-24 °C** |
| Punto caldo | **27-30 °C** |
| Temperatura, notte | **10-15 °C** |
| Umidità | **40-100%** |
| UVB | **Indispensabili**<br>Zona Ferguson 3 |
| Alimentazione | **Insetti** |
| Detenzione | **Singolarmente** |

#### RIPRODUZIONE

| | |
|---|---|
| Riproduzione | **Vivipara** |
| Maturità sessuale | **5-12 mesi** |
| Piccoli per parto | **8-30 piccoli** |
| Gestazione | **150-180 giorni** |

#### TUTELA E DOCUMENTI

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendice II** |
| Allegato UE | **Allegato B** |
| IUCN | **Minima preoccupazione (LC)** |

## La cura in breve

| | |
|---|---|
| **IL TERRARIO** | Un adulto ha bisogno di un terrario di almeno 60 × 60 × 120 cm (lunghezza × larghezza × altezza). L'altezza è più importante della superficie di base, perché la specie usa tutta l'altezza. |
| **TEMPERATURA** | La specie vive negli altopiani e sopporta male il caldo. La temperatura diurna nel terrario deve essere di 20-24 °C. Nel punto di insolazione sotto la lampada devono esserci 27-30 °C. |
| **UMIDITÀ E ACQUA** | L'umidità dell'aria deve seguire il ritmo giornaliero della specie: circa 90-100 % di notte e 40-50 % di giorno. Un 60-80 % costante non è corretto e può far ammalare l'animale. |
| **ILLUMINAZIONE E UVB** | La specie è diurna e ha bisogno di molta luce. Un tubo T5 HO da 6500 K o una potente lampada LED su tutta la larghezza del terrario forniscono la luce. |
| **ALIMENTAZIONE** | *T. jacksonii* è insettivoro. La preda deve essere al massimo grande quanto la distanza tra gli occhi. Varia l'alimentazione: cavallette, grilli, ninfe di blatte, mosche e piccoli coleotteri. |
| **COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE** | La specie si tiene singolarmente per tutta la vita. I maschi sono territoriali e non devono mai potersi vedere. Due animali si riuniscono solo quando una femmina viene portata da un maschio per l'accoppiamento. |
| **AREALE D'ORIGINE** | Kenya e Tanzania. |