herpy

CECILIE

Taita African Caecilian

Boulengerula taitana

Boulengerula taitana è una piccola cecilia priva di arti che vive soltanto sulle Taita Hills, nel Kenya sud-orientale. La femmina depone poche uova in una camera scavata nel terreno e rimane con loro, e i piccoli appena nati si nutrono del suo strato cutaneo più esterno. La specie è minacciata e la sua gestione in cattività è quasi sconosciuta.

Famiglia: Herpelidae Nome precedente: *Boulengerula taitanus; Afrocaecilia taitana*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**24-30 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**5-10 anni**
Attività	**Di notte**
Stile di vita	**Scavatore**
Habitat	**Foresta montana**
Tossine cutanee	**Nessuna nota**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**40 × 30 × 30 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**21-24 °C**
Temperatura, notte	**19-22 °C**
Umidità	**90-100%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Non necessari**
Alimentazione	**Insetti e vermi/lumache**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Sviluppo	**Sviluppo diretto (senza larve)**
Luogo di deposizione	**Sul terreno**
Maturità sessuale	**24 mesi**
Uova per stagione	**5**
Cure parentali	**Sorveglia le uova**

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**In pericolo (EN)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Le conoscenze sulla gestione di *Boulengerula taitana* sono scarse. Il clima delle Taita Hills è tropicale ma mite per via dell'altitudine, con due stagioni delle piogge, e la specie vive in terreno umido e soffice.
TEMPERATURA	La temperatura del suolo non è stata misurata per la specie. 21-24 °C di giorno e 19-22 °C di notte sono una stima adatta alle cecilie terrestri e a un clima montano mite.
UMIDITÀ E NEBULIZZAZIONE	Il substrato deve essere umido in modo uniforme e l'aria nella scatola quasi satura, 90-100 %.
ACQUA E QUALITÀ DELL'ACQUA	La specie non necessita di ciotola d'acqua né di zona acquatica. La condensa sulle pareti della scatola basta per bere e l'acqua serve solo a mantenere umido il substrato.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie vive sottoterra e non ha bisogno di UVB né di altra illuminazione. Basta il normale ritmo giornaliero della stanza, con 10-14 ore di luce. La scatola si tiene al buio e non deve stare alla luce diretta del sole.
ALIMENTAZIONE	In natura *Boulengerula taitana* si nutre soprattutto di termiti e lombrichi; i piccoli mangiano soprattutto lombrichi. In cattività, i piccoli lombrichi sono l'alimento di base più realistico.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Boulengerula taitana* vive nascosta sottoterra e un animale sano resta sepolto per la maggior parte del tempo. La specie si tiene singolarmente, così peso e salute sono facili da seguire.
AREALE D'ORIGINE	Kenya.